

deste cartão.

Fale com o seu médico ou enfermeiro se tiver qualquer questão sobre a informação

consultar um profissional de saúde.

Certifique-se que tem consigo uma lista de todos os seus medicamentos sempre que

\_\_\_\_\_  
Contactos do Médico:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome do Médico:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome do Doente:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data da primeira perfusão:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data da perfusão mais recente:\_\_\_\_\_

**Data de início do tratamento e informação sobre contactos:**



## **Cartão de Alerta de MabThera® para os doentes com doenças não oncológicas**

### **Porque me foi dado este cartão?**

Este medicamento pode fazer com que tenha infeções mais facilmente. Este cartão informa-o sobre:

- O que precisa saber antes de receber MabThera
- Quais são os sinais de uma infeção
- O que fazer caso pense estar a desenvolver uma infeção.

Também inclui o seu nome e o nome e contacto do médico no outro lado do cartão.

## O que devo fazer com este cartão?

- Guarde este cartão sempre consigo, por exemplo na sua carteira ou bolsa.
- Mostre este cartão a qualquer médico, médico dentista ou enfermeiro que o assista - e não apenas ao médico especialista que lhe prescreve MabThera.

Guarde este cartão consigo durante 2 anos após a sua última dose de MabThera. Isto porque os efeitos secundários podem ocorrer vários meses após o fim do tratamento.

## Quando não devo receber MabThera?

Não receba MabThera se tem uma infeção ativa ou um problema grave do seu sistema imunitário.

Informe o seu médico ou enfermeiro se estiver a tomar ou tomou previamente medicamentos que podem afetar o seu sistema imunitário (inclui a quimioterapia).

## Quais são os sinais de uma infeção?

Esteja atento aos seguintes possíveis sinais de infeção:

- Febre ou tosse persistentes
- Perda de peso
- Dor sem ferir-se
- Sensação de mal-estar geral ou de apatia.

**Se desenvolver qualquer um destes sinais, informe o médico ou enfermeiro imediatamente.**

**Deve também informá-los sobre o seu tratamento com MabThera.**

## Que outra informação devo saber?

MabThera pode causar raramente uma infeção grave no cérebro, chamada “Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva” ou LMP. Esta pode ser fatal.

Os sinais de LMP incluem:

- Confusão, perda de memória ou dificuldade em raciocinar
- Perda de equilíbrio ou alteração da forma como anda ou fala
- Diminuição da força ou fraqueza num dos lados do organismo
- Visão turva ou perda da visão.

Se desenvolver qualquer um destes sinais, informe o médico ou enfermeiro imediatamente. Deve também informá-los sobre o seu tratamento com MabThera.

## Onde posso obter mais informação?

Consulte o folheto informativo de MabThera para mais informação.