



O seu médico prescreveu-lhe o tratamento com Pradaxa (dabigatrano etexilato). Para que possa tomar o medicamento com segurança, por favor tenha em consideração a importante informação contida neste cartão. É importante que leia também o Folheto Informativo de Pradaxa.

Como este cartão de alerta do doente contém informação importante sobre o seu tratamento, por favor tenha-o sempre consigo e informe os profissionais de saúde de que está a tomar Pradaxa.

O SEU MÉDICO DEVERÁ
PREENCHER O VERSO
DESTE CARTÃO

Versão 3 p00136 18/02/13



PRADAXA
CARTÃO DE ALERTA PARA O DOENTE



Pradaxa - Informação para os doentes

- Siga as instruções do seu médico enquanto estiver a tomar Pradaxa.
- O Pradaxa previne a formação de coágulos sanguíneos, tornando o seu sangue mais fluído. No entanto, isto pode aumentar o risco de hemorragia.
- No caso de uma hemorragia que não pare espontaneamente, contacte imediatamente o seu médico.
- Se cair ou se se magoar durante o tratamento, especialmente se atingir a cabeça, procure atenção médica urgente. Pode ter necessidade de ser avaliado por um médico, visto poder estar em risco aumentado de hemorragia.
- Como o Pradaxa afeta o sistema de coagulação sanguínea, a maior parte dos efeitos secundários estão associados a sinais como nódos negros ou hemorragias. Sinais de hemorragia podem ser quaisquer perdas de sangue prolongadas ou excessivas, ou sinais como nódos negros ou hematomas na pele, hemorragia nasal ou dentária, sangue no vômito ou na expectoração, fezes negras, sangue na urina, menstruação demasiado abundante ou prolongada. Outros sinais e sintomas também podem resultar de hemorragia e devem levá-lo a procurar imediatamente o médico, tais como fraqueza invulgar, cansaço, palidez, tonturas, dor de cabeça, dor de barriga ou inchaço inexplicado.
- Se tiver necessidade de ser submetido a uma cirurgia ou outro procedimento invasivo, informe o seu médico de que está a tomar Pradaxa.
- Não pare de tomar Pradaxa sem falar com o seu médico, porque pode estar em risco de sofrer um acidente vascular cerebral ou outra complicação devido à formação de coágulos sanguíneos.
- Em caso de hemorragia, por favor contacte o seu médico antes de parar de tomar o Pradaxa.
- Tome o Pradaxa como indicado e não se esqueça de tomar nenhuma dose.
- Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que esteja a tomar.

Modo de administração

Pradaxa pode ser tomado com ou sem alimentos. As cápsulas devem ser engolidas inteiras com alguma água. Não abra, não mastigue e não esvazie as cápsulas, uma vez que isto pode aumentar o risco de hemorragia.

INFORMAÇÃO DO DOENTE:

Nome do doente

Data de Nascimento

Indicação para anticoagulação

Dosagem do Pradaxa

Contactos do médico prescritor

