

Flow Chart

1.

Indagar sobre qualquer tratamento actual ou anterior com antagonistas dos receptores adrenérgicos $\alpha 1a$ (incluindo a silodosina)

2.

Tratamento anterior ou actual

Sem tratamento anterior ou actual

3.

Registe a data de início e fim (se aplicável) da terapêutica com antagonistas dos receptores adrenérgicos $\alpha -1a$ (incluindo a silodosina).

Por favor considere que é recomendada a interrupção do tratamento com antagonistas dos receptores $\alpha -1 A$ duas semanas antes da cirurgia às cataratas, mas que ainda não foi estabelecido o tempo necessário e benefício desta interrupção.

Informe p.f. o Médico de Família que está marcada uma cirurgia às cataratas e considere se é apropriado interromper o tratamento.

Assegure-se que foram tomadas todas as medidas apropriadas para controlar a IFIS durante a cirurgia.

Informe p.f. o Médico de família do doente de que está marcada uma intervenção cirúrgica às cataratas e que **não é recomendado iniciar terapêutica com antagonistas dos receptores $\alpha -1A$ adrenérgicos (incluindo a silodosina).**

Referências:

1. Chang DF, Campbell JR. Intraoperative Floppy Iris Syndrome associated with tamsulosin. J. Cataract Refract Surg 2005; 31:664-73.
2. Neff KD, Sandoval HP, Fernández de Castro LE et al. Factors associated with Intraoperative Floppy Iris Syndrome. Ophthalmology 2009; 116:658-63