

Cartão de Advertência para o doente: CAPRELSA® (vandetanib)

Informação para o doente

- Este cartão contém informação de segurança importante que deverá conhecer antes do início e durante o tratamento com CAPRELSA®
- Mostre este cartão aos médicos envolvidos no seu tratamento

CAPRELSA® pode causar uma alteração da atividade elétrica do seu coração chamada **prolongamento do intervalo QTc**, a qual pode originar batimentos irregulares e alterações no ritmo do coração que podem pôr a vida em risco.

Enquanto estiver a tomar CAPRELSA®, pode ocorrer uma síndrome cerebral designada por **síndrome de encefalopatia posterior reversível (PRES; também chamada síndrome de leucoencefalopatia posterior reversível (RPLS))**.

Durante o tratamento com CAPRELSA®, telefone imediatamente ao seu médico ou avise o seu cuidador se:

- Tiver sensações de desmaio, tonturas ou se sentir o coração bater de forma irregular - estes sintomas podem estar relacionados com o prolongamento do intervalo QTc
- Tiver dores de cabeça, convulsões, confusão, dificuldade em ver ou dificuldade em pensar, pois estes podem ser sintomas de PRES

Não pare de tomar CAPRELSA®, nem altere a dose, a não ser que o seu médico lhe dê essas instruções.

Se tomar mais comprimidos de CAPRELSA® do que devia, telefone ao seu médico imediatamente.

Leia o Folheto Informativo de CAPRELSA® para mais informações

Por favor elabore uma lista de todos os outros medicamentos que está a tomar e leve-a consigo sempre que for ao seu médico.

Nome do doente:

Nome do médico:

Telefone do médico:

Data de início de tratamento com CAPRELSA®: