

CONTROLO DAS ANÁLISES CLÍNICAS

LEMBRE-SE

Quando está a tomar Valdoxan, é importante realizar análises ao sangue com regularidade.

ESTE QUADRO AJUDA-O A REGISTAR A DATA EM QUE REALIZA AS ANÁLISES

VALDOXAN 25 MG – DATA DA PRIMEIRA TOMA:	
Análises à função hepática	Data
1ª avaliação (no início)	
2ª avaliação (cerca de 3 semanas após o início)	
3ª avaliação (cerca de 6 semanas após o início)	
4ª avaliação (cerca de 12 semanas após o início)	
5ª avaliação (cerca de 24 semanas após o início)	

Se o seu médico considerar necessário, podem ser realizados mais testes.

AUMENTO DA DOSE PARA 50 MG - DATA DA PRIMEIRA TOMA:	
Análises à função hepática	Data
Avaliação inicial	
2ª avaliação (cerca de 3 semanas após aumento da dose)	
3ª avaliação (cerca de 6 semanas após aumento da dose)	
4ª avaliação (cerca de 12 semanas após aumento da dose)	
5ª avaliação (cerca de 24 semanas após aumento da dose)	

Se o seu médico considerar necessário, podem ser realizados mais testes.

Não se esqueça de trazer estes dados na próxima consulta.

Para uma informação mais detalhada, por favor consulte o Folheto Informativo que se encontra no interior da embalagem.

Versão 1 – dezembro 2014

SERVIER PORTUGAL - Especialidades Farmacêuticas, Lda

Av.ª. António Augusto de Aguiar, 128. 1069-133 Lisboa – Tel.: 21 312 20 00 – Fax: 21 312 20 90

Cartão de Informação para o Doente

Recomendações para evitar efeitos secundários sobre o fígado

Caro doente,

O seu médico receitou-lhe Valdoxan (agomelatina).

Valdoxan é um medicamento que pode ajudar a tratar a sua depressão.

Siga as recomendações do seu médico relativamente à toma de Valdoxan: dosagem, duração do tratamento e acompanhamento da terapêutica através da marcação de consultas e realização de análises ao sangue.

Este medicamento pode causar efeitos secundários, nomeadamente alterações na função hepática (funcionamento do fígado).

Este cartão reúne um conjunto de recomendações para evitar os efeitos secundários a nível do fígado e conselhos sobre o que fazer no caso de esses efeitos surgirem durante o tratamento.

Para mais informações, consulte o seu médico.

O QUE DEVE SABER ANTES DE TOMAR VALDOXAN?

• **Informe o seu médico se souber que o seu fígado não funciona bem: neste caso ele pode optar por não lhe receitar Valdoxan.**

• Podem existir **outras razões pelas quais Valdoxan não seja adequado para si.**

Por favor, aconselhe-se com o seu médico, se estiver numa destas situações:

- Se alguma vez teve problemas de fígado
- Se for obeso ou tiver excesso de peso
- Se for diabético
- Se estiver a ser tratado com outro medicamento que possa causar danos no fígado
- Se já tiver doença bipolar, se teve ou vier a desenvolver sintomas de mania (um período de excitabilidade e emoções anormalmente elevadas)
- Se sofrer de demência

O QUE FAZER PARA EVITAR PROBLEMAS HEPÁTICOS DURANTE O TRATAMENTO?

➤ **Fazer análises clínicas com regularidade**

• **Porquê?**

O seu médico deve avaliar se o seu fígado está a funcionar bem **antes de iniciar o tratamento**. As análises clínicas prescritas pelo seu médico revelarão **como o seu fígado está a funcionar** e só depois o médico decidirá se Valdoxan é adequado para si.

Durante o tratamento com Valdoxan, pode-se verificar em alguns doentes um aumento das enzimas hepáticas no sangue. Os níveis destas enzimas revelam o funcionamento adequado ou inadequado do seu fígado e são essenciais para o médico monitorizar o tratamento.

• **Quando?**

	Antes do início do tratamento ou no aumento da dose	Cerca de 3 semanas após o início do tratamento	Cerca de 6 semanas após o início do tratamento	Cerca de 12 semanas após o início do tratamento	Cerca de 24 semanas após o início do tratamento
Análises ao sangue	✓	✓	✓	✓	✓

Se o seu médico aumentar a dose para 50mg, as análises devem de ser de novo realizadas

Não se esqueça de mostrar ao seu médico o quadro resumo de controlo de análises clínicas (ver página seguinte).

Informe imediatamente o seu médico se verificar uma subida das enzimas hepáticas durante o tratamento.

➤ **Esteja atento a eventuais sintomas de problemas hepáticos**

Deve procurar aconselhamento médico com urgência porque o seu fígado poderá não estar a funcionar corretamente se observar algum dos seguintes sintomas:

- Pele/olhos amarelados
- Urina mais escura que o normal
- Fezes claras
- Dor na parte superior direita do abdómen
- Fadiga anormal / sem explicação aparente (em especial associada a um dos outros sintomas mencionados)