

Os doentes que sejam submetidos a cirurgia dentária, que não recebam tratamento dentário regular ou tenham doença gengival, sejam fumadores, que tenham diferentes tipos de cancro ou que tenham sido anteriormente tratados com um bisfosfonato (medicamento usado para tratar ou prevenir problemas ósseos) podem ter maior risco de desenvolver ONM.

### **Durante o tratamento:**

- Deve manter uma boa higiene oral, assegurar que as suas dentaduras estão bem ajustadas e realizar exames dentários de rotina.
- Se estiver em tratamento dentário ou for submeter-se a cirurgia dentária (por exemplo, extrações dentárias), informe o seu médico e diga ao seu dentista que está a ser tratado com ácido zoledrónico Hospira.
- Contacte o seu médico e dentista imediatamente se tiver algum problema com a sua boca ou dentes, tal como dentes soltos, dor ou inchaço, não-cicatrização de feridas ou de supuração (deitar pus), uma vez que estes podem ser sinais de osteonecrose da mandíbula.

Para mais informações por favor consulte o folheto informativo que vem com o seu medicamento ou em <http://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php>.

### **Comunicação de efeitos secundários**

*Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P., através do sítio da internet <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage> e/ou E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)*  
*Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.*



### CARTÃO DE ALERTA DO DOENTE

## **Ácido Zoledrónico Hospira 4 mg/100 ml solução para perfusão**

**Este cartão de alerta contém informação de segurança importante que necessita de ter em consideração antes e durante o tratamento com:**

- **Ácido Zoledrónico Hospira 4 mg/100 ml solução para perfusão**
- Ácido Zoledrónico Hospira 4 mg/5 ml concentrado para solução para perfusão

O seu médico recomendou-lhe que receba injeções de ácido zoledrónico para ajudar a prevenir complicações ósseas (por exemplo, fraturas) causadas por metástases ósseas, ou cancro nos ossos, ou para reduzir a quantidade de cálcio no sangue dos doentes adultos, onde este está muito elevado devido à existência de um tumor.

Foi notificado um efeito secundário denominado osteonecrose da mandíbula (ONM) (lesão óssea no maxilar) pouco frequente em doentes que receberam injeções de ácido zoledrónico para condições relacionadas com cancro. A ONM também pode ocorrer após a interrupção do tratamento.

A fim de reduzir o risco de desenvolver ONM, existem algumas precauções que deve tomar:

### **Antes de iniciar tratamento:**

Peça ao seu médico para lhe falar sobre a ONM.

- Confirme com o seu médico se é recomendável um exame dentário.
- Informe o seu médico/enfermeiro (profissional de saúde) se desenvolver quaisquer problemas na sua boca ou dentes.