

### Outras informações

Nome do doente:



Nome do médico:

Telefone do médico:

Este cartão de alerta do doente contém informação de segurança importante que deve ter em conta antes de iniciar e durante o tratamento com Simponi.



32862A

**Mostre este cartão a todos os médicos envolvidos no seu tratamento.**



### 3 Datas do tratamento com Simponi:

1ª administração:

/ /

Administrações seguintes:

/ /

/ /

/ /

### 4 Outras informações:

- Por favor, certifique-se que leva consigo, em todas as consultas médicas, uma lista com todos os medicamentos que se encontra a tomar.
- Guarde este cartão consigo durante 6 meses após a administração da última dose de Simponi, uma vez que podem ocorrer efeitos secundários muito tempo após a última dose de Simponi.
- Leia atentamente o folheto informativo de Simponi antes de utilizar este medicamento.

**SIDE 1/2**  
FRONT

## 1 Infecções

Quando estiver a ser tratado com Simponi, poderá contrair (desenvolver) infecções mais facilmente. As infecções poderão progredir mais rapidamente e ser mais graves. Adicionalmente, algumas infecções anteriores poderão voltar a aparecer.

### 1.1 Antes de iniciar o tratamento com Simponi:

- Informe o seu médico se tiver uma infecção. Não pode ser tratado com Simponi se tiver tuberculose (TB) ou outra infecção grave.

- Deverá ser submetido(a) a um rastreio de TB. É muito importante que diga ao seu médico assistente se alguma vez contraiu TB ou se manteve contacto directo com alguém que tenha tido ou tem TB.

**Peça ao seu médico para registar o tipo e data do(s) último(s) rastreio de TB no espaço que se segue:**

Teste \_\_\_\_\_ Data    /    /

Teste \_\_\_\_\_ Data    /    /

- Informe o seu médico se souber ou suspeitar que é portador do vírus da hepatite B.

### 1.2 Durante e após o tratamento com Simponi:

- Procure imediatamente assistência médica caso desenvolva qualquer sintoma de infecção, tal como febre, cansaço, tosse (persistente), falta de ar, sinais de gripe, perda de peso, suores nocturnos, diarreia, feridas, problemas dentários e sensação de ardor ao urinar.

## 2 Insuficiência Cardíaca

### 2.1 Antes de iniciar o tratamento com Simponi:

- Informe o seu médico assistente se tem antecedentes de insuficiência cardíaca. Não pode ser tratado com Simponi se tiver insuficiência cardíaca moderada a grave.

### 2.2 Durante e após o tratamento com Simponi:

- Caso desenvolva sintomas de insuficiência cardíaca (falta de ar ou inchaço dos pés), procure imediatamente assistência médica.

**SIDE 2/2**  
(horizontal flipped)  
**BACK**