

Pandemrix® é uma vacina para prevenir a gripe pandémica

Informe o seu médico se está grávida ou pensa estar grávida ou se planeia vir a estar grávida.

Como todos os medicamentos, Pandemrix® pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Após a vacinação podem ocorrer reacções alérgicas (podem incluir erupções cutâneas com comichão, dificuldade em respirar e inchaço da face ou da língua) que em casos raros levam ao choque.

Efeitos secundários possíveis (mais frequentes)

Dores de cabeça

Fadiga (cansaço)

Dor, vermelhidão, inchaço ou nódulo duro no local de injeção

Febre, arrepios ou sintomas tipo gripe

Músculos doridos, dor nas articulações

Estes efeitos secundários geralmente desaparecem em 1-2 dias sem tratamento.

*Se persistirem ou no caso de ocorrerem outros efeitos secundários, **CONSULTE O SEU MÉDICO***

**Para informação sobre esta vacina por favor solicite o folheto informativo no local de vacinação.
Em caso de dúvida consulte:**

GlaxoSmithKline

LIS.nucleo-farmacovigilancia@gsk.com

Direcção Geral de Saúde

www.dgs.pt

INFARMED, I.P.

www.infarmed.pt

EMA

<http://www.emea.europa.eu/>