

CARTÃO DE ALERTA DO DOENTE

0ENBRT1404001

Laboratórios Pfizer, Lda. | Sociedade Comercial por Quotas | Lagoas Park, Edifício 10, 2740-271
Porto Salvo, Portugal | NIPC / Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais
sob o nº 500 162 166 | Capital Social 7.346.687,82 Euros

Este cartão contém informação de segurança importante que necessita de saber antes de iniciar o Enbrel® e durante o tratamento com Enbrel®. Se não compreender esta informação peça esclarecimentos ao seu médico.

- Mostre este cartão a todos os médicos que o assistam no seu tratamento.
- Leia o folheto informativo do Enbrel® para mais informações.
- Guarde este cartão consigo durante 2 meses após a administração da última dose de Enbrel®, uma vez que os efeitos secundários podem ocorrer após a administração da última dose de Enbrel®.

Infeções

O Enbrel® pode aumentar o risco de contrair infeções que podem ser graves.

- Não deve utilizar o Enbrel® se contraiu uma infeção. Caso tenha dúvidas, fale com o seu médico.
- Se surgirem sintomas de infeção, tais como febre, tosse persistente, perda de peso, apatia, procure imediatamente assistência médica.
- Deverá fazer o rastreio da tuberculose (TB). Peça ao seu médico que registe as datas e os resultados do seu último rastreio da TB abaixo:

Teste: _____

Data: _____

Resultados: _____

Teste: _____

Data: _____

Resultados: _____

Peça ao seu médico para listar os outros medicamentos que está a tomar que possam aumentar o risco de contrair infeções.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Insuficiência Cardíaca Congestiva

Se sofre de insuficiência cardíaca congestiva e pensa que os sintomas se estão a agravar (por exemplo falta de ar ou inchaço dos pés), procure imediatamente assistência médica.

Outras Informações (a preencher pelo doente)

Nome do Doente: _____

Nome do Médico: _____

Telefone do Médico: _____

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste cartão, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através de:

INFARMED, I.P. Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40 | **Fax:** + 351 21 798 73 97
Web: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

