


INFORMAÇÃO DESTINADA A PRESCRITORES DE ALZEN® OU ALZEN® SR NOS EPISÓDIOS DEPRESSIVOS NA DOENÇA BIPOLAR

Alzen® e Alzen® SR estão agora aprovados em Portugal para o tratamento de episódios depressivos *major* na perturbação bipolar. O esquema de início de terapêutica e as advertências associadas a esta nova indicação são diferentes dos verificados em episódios de mania ou na esquizofrenia, pelo que aconselhamos a leitura atenta da informação constante neste material.

Esquema de terapêutica

Perturbação Bipolar

Episódios Depressivos



Em episódios depressivos na perturbação bipolar, o tratamento com quetiapina foi associado a sonolência e sintomas relacionados (tais como sedação), bem como ao aumento de sintomas extrapiramidais. Consultar os detalhes no verso.

INFORMAÇÃO DESTINADA A PRESCRITORES DE ALZEN® OU ALZEN® SR NOS EPISÓDIOS DEPRESSIVOS NA DOENÇA BIPOLAR

Alzen® e Alzen® SR estão agora aprovados em Portugal para o tratamento de episódios depressivos *major* na perturbação bipolar. O esquema de início de terapêutica e as advertências associadas a esta nova indicação são diferentes dos verificados em episódios de mania ou na esquizofrenia, pelo que aconselhamos a leitura atenta da informação constante neste material.

Advertências

Perturbação Bipolar

Episódios Depressivos

O tratamento com quetiapina foi associado a sonolência e sintomas relacionados (tais como sedação). Em ensaios clínicos, o início destes sintomas ocorreu normalmente nos primeiros três dias de tratamento, com intensidade ligeira a moderada.

Doentes com depressão bipolar que apresentam sonolência de intensidade grave podem necessitar de contacto mais frequente e por um período mínimo de 2 semanas após o início deste quadro, ou até que os sintomas melhorem, podendo ser necessário considerar a descontinuação do tratamento.

Em ensaios clínicos controlados com placebo, foi associada à quetiapina um aumento da incidência de sintomas extrapiramidais comparativamente ao placebo, em doentes tratados para episódios depressivos *major* na perturbação bipolar.

Se surgirem sinais ou sintomas de discinesia tardia, deve ser considerada a redução da dose ou a interrupção do tratamento com **Alzen®** ou **Alzen® SR**.

Para mais informações consultar o titular da Autorização de Introdução no Mercado ou o Resumo das Características do Medicamento. Sob licença AstraZeneca.

tecnifar
GRUPOTECNIFAR
Melhor desempenho no sector dos
Produtos Farmacêuticos em 2008

1000
milhares
PME
EXAME
TECNIFAR - GRUPO TECNIFAR
Rua Tierno Galvan, torre 3 - 12º - 1099-036 Lisboa
Tel: 210 330 700 - Fax: 210 330 709
Email: grupotecnifar@tecnifar.pt
Linha farmacovigilância: 21 386 09 29
Email: farmalieria@tecnifar.pt