

Material educacional para as doentes

Utilizar Delyba™▼(delamanid)
durante a gravidez ou a amamentação

▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de novas informações de segurança. Poderá ajudar, comunicando quaisquer efeitos secundários que tenha para os contactos a seguir indicados.

Foi-lhe diagnosticada uma infeção bacteriana grave, chamada tuberculose multirresistente. O seu médico decidiu tratá-la com Delyba que é um antibiótico utilizado para o tratamento da tuberculose nos pulmões, causada por bactérias que não são eliminadas pelos antibióticos utilizados mais frequentemente para tratar a tuberculose.

Leia atentamente este material educacional, uma vez que irá dar-lhe informações importantes sobre a utilização de Delyba durante a gravidez ou enquanto estiver a amamentar. Este guia não substitui falar com o médico sobre a sua doença ou o seu tratamento. Certifique-se de que leu e compreendeu o Folheto Informativo incluído na embalagem do medicamento e de que conversou sobre o tratamento com o médico antes de iniciar o tratamento.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver algum efeito secundário enquanto estiver a tomar Delyba, fale com o médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isto inclui quaisquer possíveis efeitos secundários que não estejam referidos no Folheto Informativo. Também pode comunicar os efeitos secundários através dos seguintes contactos:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Otsuka Novel Products GmbH

Telefone 24h: +351 933 922 858

Telefone fixo: +351 210 134 486

Email: otsuka@yabulu.com

Ao comunicar os efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

O que precisa de saber sobre a utilização de Delyba durante a gravidez ou enquanto está a amamentar?

A informação importante que deve saber antes de começar o tratamento é:

- Este medicamento pode causar lesões ao seu bebé antes de nascer.
- Se está grávida ou acha que pode estar grávida, ou se está a planear engravidar, informe o médico imediatamente e siga as recomendações que este lhe indicar.
- Enquanto estiver a tomar Delyba deve utilizar uma contraceção eficaz para evitar a gravidez.
- Se descobrir que engravidou enquanto estava a ser tratada com Delyba, deve contactar o médico e marcar uma consulta sem demora.
- Se estiver a amamentar o seu bebé, deve mudar para o leite em pó antes de ser tratada com Delyba, porque o medicamento pode passar para o bebé através do seu leite.



Certifique-se de que lê todo o Folheto Informativo incluído na embalagem, uma vez que este contém todas as informações importantes que deve saber sobre este medicamento.

Peça ao médico que lhe explique qualquer coisa que não compreenda ou que responda a quaisquer dúvidas que possa ter.

Fornecido por:

Otsuka Novel Products GmbH
Erika-Mann-Straße 21
80636 Munique, Alemanha

