

COMUNICAÇÃO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS

Se tiver ou suspeitar de quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.



CALENDÁRIO DE PERFUSÃO

▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Poderá ajudar, comunicando quaisquer efeitos secundários que tenha.

ANTES DO TRATAMENTO COM FLIXABI®

- Informe o seu médico se foi submetido a tratamento com infliximab no passado.
- Leia atentamente o folheto informativo.

DURANTE O TRATAMENTO COM FLIXABI®

- Informe imediatamente o seu médico se tiver sinais de uma infeção.
- Os sinais de infeção incluem: febre, sensação de cansaço, tosse (persistente), falta de ar, perda de peso, suores noturnos, diarreia, feridas, problemas dentários, ardor ao urinar ou sintomas gripais.



FLIXABI® (INFLIXIMAB) CALENDÁRIO DE PERFUSÃO

1.ª perfusão	2.ª perfusão	3.ª perfusão	4.ª perfusão Outro (por favor especifique)*	5.ª perfusão Outro (por favor especifique)*	6.ª perfusão Outro (por favor especifique)*	7.ª perfusão Outro (por favor especifique)*	8.ª perfusão Outro (por favor especifique)*
Semana 0	Semana 2	Semana 6	<input type="checkbox"/> Intervalos de 6 semanas <input type="checkbox"/> Intervalos de 8 semanas	<input type="checkbox"/> Intervalos de 6 semanas <input type="checkbox"/> Intervalos de 8 semanas	<input type="checkbox"/> Intervalos de 6 semanas <input type="checkbox"/> Intervalos de 8 semanas	<input type="checkbox"/> Intervalos de 6 semanas <input type="checkbox"/> Intervalos de 8 semanas	<input type="checkbox"/> Intervalos de 6 semanas <input type="checkbox"/> Intervalos de 8 semanas
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Nome de marca	Nome de marca	Nome de marca	Nome de marca	Nome de marca	Nome de marca	Nome de marca	Nome de marca
Número de lote	Número de lote	Número de lote	Número de lote	Número de lote	Número de lote	Número de lote	Número de lote

*Alguns doentes podem necessitar de um calendário de tratamento diferente. O seu médico decidirá se é o seu caso, com base em fatores como o tipo de doença e severidade, peso corporal, resultados de análises e na forma como responde ao tratamento com FLIXABI.

- **Caso se esqueça ou falte a uma consulta para receber FLIXABI, marque nova consulta o mais cedo possível.**
- **Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização de FLIXABI, fale com o seu médico ou farmacêutico.**

1ª versão aprovada em 07-2016 pelo INFARMED, I.P.
08-2016 - (IS) PT v 1.0