

## Página de Trás

### **Durante o tratamento:**

- Deve manter uma boa higiene oral, garantir que as próteses estão bem ajustadas e realizar exames dentários de rotina.
- Se estiver em tratamento dentário ou se for submetido a cirurgia dentária (por exemplo, extracções de dentes), informe o médico e diga ao seu dentista que está a ser tratado com Pamidran.
- Contacte imediatamente o seu médico e dentista se observar quaisquer problemas com a sua boca ou dentes, tais como dentes a abanar, dor ou inchaço, não cicatrização de feridas ou supuração (deltar pus), pois estes poderão ser sinais de osteonecrose da mandíbula.

Para mais informação, leia o folheto informativo, disponível em [www.infarmed.pt](http://www.infarmed.pt) (Infomed).

### **Comunicação de efeitos secundários**

Se tiver ou suspeitar de quaisquer efeitos secundários associados à utilização deste medicamento por favor notifique-os através dos seguintes contactos:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73, Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita), Fax: +351 21 798 73 97

Sítio da internet:

<http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

Hospira Portugal Lda,

Tel: 21 423 55 23, Fax: 800 827 808

E-mail: [PRT.AEReporting@pfizer.com](mailto:PRT.AEReporting@pfizer.com)

Versão 1, aprovada pelo Infarmed em setembro de 2016

PT-PAM-07-2016



## Página da Frente

### **CARTÃO DE ALERTA DO DOENTE**

**Este cartão lembrete contém informação de segurança importante que deverá conhecer antes e durante o tratamento com injeções de Pamidran para situações relacionadas com o cancro.**

O seu médico recomendou-lhe que recebesse injeções deste medicamento para ajudar a prevenir complicações ósseas (por exemplo, fraturas) provocadas por metástases ou cânceros nos ossos, ou mieloma múltiplo com lesões ósseas, adicionalmente ao tratamento tumoral específico. Também pode ser utilizado no tratamento dos tumores induzidos por hipercalemia.

Foi notificado um efeito secundário designado por osteonecrose da mandíbula (ONM) (lesão óssea da mandíbula) com pouca frequência em doentes a receber injeções de Pamidran para situações relacionadas com o cancro. Também pode ocorrer ONM depois de parar o tratamento.

De forma a reduzir o risco de desenvolvimento de osteonecrose da mandíbula, deverá tomar algumas precauções:

#### **Antes de iniciar o tratamento:**

- Peça informações sobre a ONM ao seu médico antes de iniciar o tratamento.
- Verifique junto do seu médico se é recomendável um exame dentário antes de iniciar o tratamento com Pamidran.
- Informe o seu médico/enfermeiro (profissional de saúde) se desenvolver quaisquer problemas na boca ou dentes.

Os doentes submetidos a cirurgia dentária (por exemplo, extracções de dentes) que não tenham cuidados dentários de rotina ou tenham doença gengival, sejam fumadores, recebem tipos diferentes de tratamentos para o cancro ou que tenham sido anteriormente tratados com um bifosfonato (utilizado para tratar ou prevenir problemas nos ossos) podem ter um risco mais elevado de desenvolver ONM