

Paracetamol Actavis Solução para perfusão

Precaução na utilização: Risco de Erros de Medicação

Informação importante sobre Paracetamol Actavis 10 mg/ml Solução para perfusão

Risco de Erros de Medicação

Tenha especial atenção quando prescrever e administrar Paracetamol Actavis no sentido de evitar erros de dosagem devido à confusão entre miligramas (mg) e mililitros (ml), os quais podem conduzir a sobredosagem acidental e morte. Assegure-se de que a dose correta é comunicada e dispensada. No ato da prescrição, inclua a dose total em mg e a dose total em volume. Assegure-se de que a dose é calculada e administrada corretamente.

A dose baseada no peso do doente é apresentada na tabela abaixo:

Peso do doente	Dose por administração	Volume por administração	Volume Máximo de Paracetamol Actavis (10 mg/ml) por administração, baseado nos limites superiores de peso corporal do grupo (ml)***	Dose Máxima Diária **
≤10 kg *	7.5 mg/kg	0.75 ml/kg	7.5 ml	30 mg/kg
> 10 kg e ≤33 kg	15 mg/kg	1.5 ml/kg	49.5 ml	60 mg/kg não excedendo 2 g
> 33 kg e ≤50 kg	15 mg/kg	1.5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg não excedendo 3 g
>50 kg com fatores de risco adicionais para hepatotoxicidade	1g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg e sem fatores de risco adicionais para hepatotoxicidade	1 g	100 ml	100 ml	4 g

* **Recém-nascidos prematuros:** Não existem dados de segurança e eficácia sobre a utilização em recém-nascidos prematuros.

** **Dose diária máxima:** A dose diária máxima apresentada na tabela acima é indicada para doentes que não estão a tomar quais outros medicamentos contendo paracetamol, e deverá ser devidamente ajustada tendo em consideração a toma de outros medicamentos contendo paracetamol.

*** **Doentes com peso inferior requerem volumes menores.**

O intervalo mínimo entre cada administração deve de ser, pelo menos, de 4 horas.
O intervalo mínimo entre cada administração em doentes com insuficiência renal severa (clearance da creatinina inferior a 30 ml/min) deve ser, pelo menos, de 6 horas.
Não se podem administrar mais do que 4 doses em cada 24 horas.

A solução de paracetamol é administrada por perfusão intravenosa de 15 minutos.

Por favor, siga as seguintes orientações quando prescrever para doentes com peso ≤ 10 kg:

- O frasco de vidro de Paracetamol Actavis não deve ser pendurado como numa infusão devido ao pequeno volume de medicamento a ser administrado nesta população
- O volume a ser administrado deve ser retirado do frasco e diluído em solução de cloreto de sódio a 0.9% ou em solução de glucose a 5% até um décimo (1 volume de Paracetamol Actavis em 9 volumes de diluente) e administrado durante 15 minutos
- Deve ser utilizada uma seringa de 5 ou 10 ml para medir a dose adequada ao peso da criança e o volume apropriado. No entanto, nunca poderão ser ultrapassados os 7.5 ml por dose
- O utilizador deve consultar a informação do medicamento sobre as orientações de dosagem.

Para remover a solução, utilize uma seringa de 0.8 mm (agulha de calibre 21) e perfure verticalmente a tampa no local especificamente indicado para o efeito.

Paracetamol Actavis 10 mg/ml Guia de dosagem

Peso do doente (Kg)	Dose por administração (mg)	Volume por administração (ml)
1	7.50	0.75
2	15.00	1.50
3	22.50	2.25
4	30.00	3.00
5	37.50	3.75
6	45.00	4.50
7	52.50	5.25
8	60.00	6.00
9	67.50	6.75
10	75.00	7.50
11	165.00	16.50
12	180.00	18.00
14	210.00	21.00
16	240.00	24.00
18	270.00	27.00
20	300.00	30.00
22	330.00	33.00
24	360.00	36.00
26	390.00	39.00
28	420.00	42.00
30	450.00	45.00
32	480.00	48.00
33	495.00	49.50
34	510.00	51.00
36	540.00	54.00
38	570.00	57.00
40	600.00	60.00
42	630.00	63.00
44	660.00	66.00
46	690.00	69.00
48	720.00	72.00
50	750.00	75.00
> 50	1000.00	100.00

