

Cartão de Aviso do Doente

Leia esta página atentamente se é uma mulher em idade fértil

Gravidez

Tracleer pode causar danos no desenvolvimento do feto. Por isso, não pode tomar Tracleer se estiver grávida e também não pode engravidar enquanto estiver a tomar Tracleer.

Para além disso, se sofre de doença de hipertensão pulmonar, a ocorrência de uma gravidez pode deteriorar gravemente os sintomas da sua doença. Se suspeita que possa estar grávida, diga ao seu médico ou ginecologista.

Contraceção

Métodos contraceptivos hormonais – tais como contraceptivos orais ou comprimidos contraceptivos, injeções hormonais, implantes ou sistemas cutâneos contraceptivos não evitam de forma fiável a gravidez em mulheres que estão a tomar Tracleer. Necessita de utilizar um método contraceptivo de barreira – como um preservativo, diafragma ou esponja vaginal – adicionalmente a qualquer um destes tipos de métodos contraceptivos hormonais. Assegure-se que fala de quaisquer dúvidas que possa ter com o seu médico ou com o seu ginecologista – preencha os detalhes na parte de trás deste cartão e leve-o ao seu médico ou ginecologista na sua próxima consulta.

Deve realizar um teste de gravidez antes de iniciar Tracleer e todos os meses durante o tratamento mesmo que pense que não está grávida.

Data do primeiro teste mensal:

Contraceção

Atualmente utiliza ou toma contraceptivos?

☐ Sim ☐ Não

Se Sim, escreva os nomes deles aqui:

Leve este cartão ao seu médico ou ao seu ginecologista na sua próxima consulta e ele será capaz de a aconselhar sobre se necessita de utilizar métodos contraceptivos adicionais ou alternativos.

Análise sanguínea da função hepática

Alguns dos doentes a tomar Tracleer tiveram resultados alterados nas análises da função hepática. Durante o tratamento com Tracleer o seu médico requererá que faça análises sanguíneas com intervalos regulares a fim de verificar a presença de alterações na sua função hepática.

→ **Lembre-se de fazer as suas análises sanguíneas hepáticas todos os meses. Duas semanas depois de um aumento dose, é necessário fazer análises adicionais.**

Data da primeira análise mensal:

Calendário de análises sanguíneas mensais da função hepática:

Jan	Fev	Mar	Abr
Mai	Jun	Jul	Ago
Set	Out	Nov	Dez



Avisos de Segurança Importantes para os Doentes a tomarem Tracleer (bosentano)



Actelion Registration Ltd

Este cartão contém informação importante sobre Tracleer. Por favor leia este cartão atentamente antes de começar o seu tratamento com Tracleer.

O seu nome:

Médico prescriptor:

Caso tenha dúvidas sobre Tracleer fale com o seu médico.