

Possíveis efeitos secundários de Volibris

O Folheto Informativo incluído na embalagem contém uma lista completa dos efeitos secundários conhecidos de Volibris.

Esteja atento aos sinais que lhe indicam que pode estar a ter os seguintes efeitos secundários:

Inchaço (edema), especialmente nos tornozelos e pés

O que fazer: Informe o seu médico se notar este efeito secundário, ou se notar que está a piorar.

Anemia (um reduzido número de glóbulos vermelhos)

Sinais de anemia:

- Cansaço, fraqueza ou má disposição geral
- Falta de ar.

O que fazer: Assegure-se que continua a fazer análises regulares ao sangue para controlar este efeito secundário. Informe o seu médico se notar algum destes sintomas, uma vez que foram notificados alguns casos de anemia que requereram transfusões de sangue.

Lesão hepática

Este efeito secundário é pouco frequente, afetando até 1 em 100 indivíduos a tomar Volibris.

Sinais de que o seu fígado pode não estar a trabalhar bem:

- Perda de apetite
- Sensação de má disposição, estar mal disposto (náuseas e vómitos)
- Temperatura elevada (febre)
- Dor no estômago (abdómen)
- Amarelecimento da sua pele ou da cor branca dos seus olhos
- Urina de cor escura
- Comichão na pele.

O que fazer: Assegure-se de que continua a fazer análises regulares ao sangue para verificar este efeito secundário. **Informe o seu médico imediatamente** se notar estes sintomas, ou se estes surgirem subitamente após tomar Volibris.

Reações alérgicas: estas são frequentes, afectando até 1 em 10 indivíduos a tomar Volibris.

Sinais de uma reacção alérgica:

- Erupção cutânea
- Comichão ou inchaço (normalmente da face, lábios, língua ou garganta) que podem causar dificuldade em respirar ou engolir.

O que fazer: **Obtenha ajuda médica imediatamente** se notar estes sintomas, especialmente se estes surgirem subitamente após tomar Volibris.

Se tem algum sintoma que o preocupe:

Informe o seu médico, quer pense, ou não, que os sintomas possam ser um efeito secundário de Volibris.

Contactos para informação

Nome do médico

Morada

Telefone

Outros Contactos

O que deve saber se estiver a tomar (ambrisentano)

Volibris®

Este material educacional dá-lhe informação e conselhos relativamente ao tratamento com Volibris.

Leia-o com atenção e conserve-o enquanto estiver a tomar Volibris caso necessite de o reler.

O Folheto Informativo fornecido dentro de cada embalagem de Volibris contém informação mais detalhada.

Por favor leia-o também.

Se tiver dúvidas, ou se tiver mais alguma questão, fale com o seu médico ou farmacêutico.

O que é a HAP? O que é Volibris e Como funciona?

Foi-lhe prescrito Volibris para tratar a sua hipertensão arterial pulmonar (HAP).

A HAP é pressão sanguínea elevada nos vasos sanguíneos (as artérias pulmonares) que transportam o sangue do coração para os pulmões. Em pessoas com HAP, estas artérias ficam mais estreitas, pelo que o coração tem de trabalhar mais para bombear o sangue através delas. As pessoas com HAP sentem-se muitas vezes cansadas, com tonturas e falta de ar.

Volibris é um tipo de medicamento denominado antagonista do recetor da endotelina (ARE). Atua tornando as artérias pulmonares mais largas, de modo a que o coração consiga mais facilmente bombear o sangue através delas. Isto baixa a pressão arterial e alivia os sintomas.

! Não dê Volibris a outros, mesmo que apresentem os mesmos sintomas.

Enquanto estiver a tomar Volibris, lembre-se:

Irá necessitar de realizar análises ao sangue regularmente:

- Para verificar se o seu fígado está a trabalhar bem. Recomenda-se que faça estes testes todos os meses.
- Para verificar se está anémico (com um reduzido número de glóbulos vermelhos). Recomenda-se que faça estes testes no primeiro mês, no terceiro mês, e periodicamente a partir daí, em intervalos regulares. O seu médico irá assegurar-se que realiza estes testes quando necessário.

Se consultar outro médico:

Se consultar algum médico que não seja o seu médico que o acompanha habitualmente, é importante que o informe que está a tomar Volibris.

Traga sempre consigo o seu Cartão de Memória do doente, em caso de emergência.

Gravidez e Volibris

Se for uma mulher em idade fértil:

- Volibris pode causar malformações congénitas graves em bebés se estes forem concebidos antes, durante ou até um mês após o tratamento.
- **Se estiver grávida**, não poderá começar a tomar Volibris.
- O seu médico irá pedir-lhe que faça um **teste de gravidez** antes de começar a tomar Volibris, e todos os meses enquanto estiver a tomar Volibris.
- **É muito importante que use um método de contraceção seguro** (controlo da natalidade) enquanto estiver a tomar Volibris. É preferível que utilize, em conjunto com o seu parceiro, dois métodos de contraceção que atuem de maneira diferente (por exemplo: duplo método de barreira e outro método adicional). Fale com o seu médico sobre isto.
- **Se tiver um atraso na menstruação**, ou pensar que possa estar grávida, contacte o seu médico imediatamente.
- **Se engravidar**, fale com o seu médico tão cedo quanto possível sobre os riscos e benefícios de continuar a tomar Volibris.
- Se estiver a pensar em planear uma gravidez, fale com o seu médico.
- **Se parar de tomar Volibris**, não deve engravidar durante pelo menos um mês após a paragem do tratamento.
- **Se necessitar de alterar ou parar** o método de contraceção que está a usar:
 - Informe o médico prescriptor da contraceção, que está a tomar Volibris.
 - Informe o médico prescriptor de Volibris, da alteração na sua contraceção.

Se for um homem e estiver a tomar Volibris:

É possível que Volibris possa diminuir a sua contagem de esperma, o que pode afectar a sua fertilidade.

- Fale com o seu médico se tiver alguma questão ou preocupações relativamente a isto.