

A tomar *Volibris*®

Conserve este cartão de memória consigo enquanto estiver a tomar Volibris.

Se consultar algum médico que não seja o seu médico habitual, mostre-lhe este cartão.

Para mais informações sobre Volibris:

- Leia o material educacional “*Brochura informativa para os doentes*” que lhe foi entregue pelo seu médico
- Leia o Folheto Informativo fornecido em cada embalagem do medicamento
- Pergunte ao seu médico ou farmacêutico

Estas secções devem ser preenchidas pelo médico prescriptor

Volibris (ambrisentano) é um antagonista do recetor da endotelina (ARE) seletivo para o recetor da endotelina A (ETA).

Contactos do médico prescriptor

Nome

Outros Contactos

Dados do Doente

Data de início da Terapêutica com Volibris

Resultados dos testes de função hepática, antes do início da terapêutica

ALT

AST

Resultados da contagem de células sanguíneas, antes do início da terapêutica

Hemoglobina

Hematócrito

Se for uma mulher em idade fértil

- Não tome Volibris se estiver grávida ou a amamentar
- É muito importante que use um método de contraceção seguro (controlo da natalidade) enquanto estiver a tomar Volibris. Discuta este assunto com o seu médico
- Se tiver um atraso na menstruação, ou se pensar que possa estar grávida, contacte o seu médico imediatamente
- Terá de fazer testes de gravidez todos os meses

Resultados das análises ao sangue

Enquanto estiver a tomar Volibris, deve fazer análises regulares ao sangue:

- **para verificar se o seu fígado está a trabalhar bem.** Recomenda-se que faça estes testes todos os meses.
- **para verificar se tem anemia** (um número reduzido de glóbulos vermelhos). Recomenda-se que estes testes sejam feitos 1 e 3 meses após o início do tratamento, e posteriormente de forma periódica.

Se for uma mulher em idade fértil, terá de realizar **testes de gravidez** todos os meses.

Registre aqui as suas notas

[illegible]

Notas
