

Importante: Tenha atenção ao Tomar PRILIGY®

Tenha atenção ao tomar PRILIGY® uma vez que este pode causar desmaio ou tonturas.

Se sentir que vai desmaiar, deite-se imediatamente, com a cabeça numa posição mais baixa que o resto do corpo, ou sente-se com a cabeça entre os joelhos até se sentir melhor. Deste modo não irá cair e magoar-se se realmente desmaiar.

Evite guiar ou utilizar máquinas perigosas se sentir tonturas ou sensação de desmaio.

Evite ingerir álcool enquanto está a tomar PRILIGY®. Associar PRILIGY® com álcool pode aumentar a probabilidade de desmaiar, aumentando deste modo o risco de lesões acidentais; pode também potenciar os efeitos relacionados com o consumo de álcool.

Três Passos para Diminuir o Risco de Desmaio e de Baixa da Pressão Arterial

Pode ocorrer desmaio ou baixa da pressão arterial quando se levanta, mas há 3 passos que podem diminuir este risco.

1. Tome PRILIGY® com água e não tome PRILIGY® se estiver desidratado

Pode ficar desidratado, ou não ter água suficiente no organismo, se:

- Não tiver bebido nada nas últimas 4 a 6 horas .
- Tiver suado durante muito tempo
- Tiver febre alta ou diarreia ou estiver doente

2. Não se levante rapidamente após ter estado sentado ou deitado durante muito tempo depois de tomar PRILIGY®

3. Caso sinta que vai desmaiar ou fica enjoado quando se levanta, deite-se imediatamente de modo a que a sua cabeça fique numa posição inferior ao resto do seu corpo ou sente-se com a cabeça entre os joelhos até se sentir melhor

- Desta forma evitará quedas e a possibilidade de se magoar se desmaiar
- Sinais que pode vir a desmaiar, incluem sentir-se:

- Enjoado
- Transpirado
- Confuso
- A desfalecer
- Tonto
- Com batimento cardíaco anormal

Informe o seu médico se desmaiou ao tomar este medicamento.



**INFORMAÇÃO IMPORTANTE
SOBRE O TRATAMENTO COM PRILIGY®**

BROCHURA PARA O DOENTE



A. MENARINI PORTUGAL

Considerações Importantes de Tratamento

- PRILIGY® é usado no tratamento da ejaculação prematura (EP) em homens dos 18 aos 64 anos de idade
- PRILIGY® deve ser tomado 1 a 3 horas antes da atividade sexual espectável, tal como indicado pelo seu médico
- Os efeitos secundários mais frequentes são tonturas, dores de cabeça e enjoos (náuseas)
- Pouco frequentemente, pode ocorrer desmaio. Se sente que está quase a desmaiar (os sintomas incluem náuseas, tonturas, confusão, transpiração aumentada ou batimento cardíaco anormal), ou a sentir uma sensação de desmaio quando se coloca em pé, deite-se imediatamente de modo que a sua cabeça fique numa posição inferior ao resto do seu corpo ou sente-se com a cabeça entre os joelhos até se sentir melhor
- Para mais informação:
 - Fale com o seu médico ou farmacêutico
 - Consulte o Folheto Informativo incluído na embalagem do seu medicamento.

PRILIGY® E A EJACULAÇÃO PRECOCE (EP)

- A EP é definida como:
 - Ejaculação persistente ou recorrente que ocorre após pouca estimulação sexual antes, durante ou logo após penetração vaginal
 - Incapacidade que o homem apresenta para controlar ou atrasar a ejaculação imediatamente antes ou durante a penetração vaginal
- PRILIGY® contém uma substância ativa denominada 'dapoxetine'. Esta substância pertence a um grupo de medicamentos chamados "inibidores selectivos da recaptação da serotonina" (ISRS). O seu mecanismo de ação leva a um aumento dos níveis de serotonina, uma substância química natural que pode prolongar o tempo até à ejaculação tornando mais lento o mecanismo do organismo responsável pela EP. Pela sua indicação, PRILIGY® poderá também ser conhecido como um medicamento urológico.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

Quem Deve Tomar PRILIGY®?

- PRILIGY® está indicado no tratamento de EP em homens com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos de idade
- PRILIGY® é apenas para homens aos quais foi diagnosticada EP pelo seu médico.

PRILIGY® é um medicamento sujeito a receita médica

NÃO partilhe o seu PRILIGY® com outros, mesmo que os sintomas pareçam ser os mesmos ou semelhantes aos seus.

Como Tomar PRILIGY®

Tome PRILIGY® 1 a 3 horas antes da atividade sexual, mas não mais do que uma vez a cada 24 horas.

- A dose inicial recomendada para todos os doentes é de 30 mg. Em algumas situações, e depois de uma avaliação cuidada, o médico pode aumentar a dose para 60 mg
- Os comprimidos deverão ser engolidos inteiros para evitar o sabor amargo, com pelo menos um copo cheio de água
- PRILIGY® pode ser tomado com ou sem alimentos
- Evite o consumo de álcool enquanto está a tomar PRILIGY®. A associação de PRILIGY® com álcool pode aumentar a possibilidade de desmaio e pode também potenciar os efeitos relacionados com o consumo de álcool, como sentir tonturas, ter sono e reações lentas
- Não utilize PRILIGY® em associação com substâncias para uso recreativo (como ecstasy, LSD, narcóticos ou benzodiazepinas) que podem originar reações súbitas e potencialmente graves quando usados em associação com PRILIGY®.

**Tome PRILIGY® 1 a 3 horas antes da atividade sexual.
Não tome mais PRILIGY® que o prescrito pelo médico.**

Não tome PRILIGY® mais do que uma vez a cada 24 horas.

Se tem dúvidas sobre como tomar PRILIGY®, fale com o seu médico ou farmacêutico