

Lista das ações a efetuar antes de prescrever Strattera

Identificação do doente _____ Data _____

O diagnóstico do doente foi feito por um especialista no tratamento de PHDA segundo os critérios da DSM e as *guidelines* do ICD.

☐

Foi feita uma avaliação exaustiva da história médica incluindo:

☐

- Medicções concomitantes: _____

Nota: Strattera deve ser utilizado com precaução quando associado a medicamentos anti-hipertensores, medicamentos que possam aumentar a pressão arterial ou com efeitos cardiovasculares (como salbutamol).

- História familiar: _____

Nota: história familiar de morte súbita cardíaca ou inexplicada ou arritmia maligna é um factor de risco para os resultados cardiovasculares.

- Comorbilidades anteriores ou presentes: _____

Foi feito um exame físico.

Resultado: _____

☐

Foi feita uma avaliação inicial do estado cardiovascular do doente, incluindo a medição da pressão arterial e do ritmo cardíaco.

(No caso de crianças, recomenda-se que estes dados sejam registados num gráfico de percentis; se o gráfico de percentis não estiver disponível, os registos devem se feitos no gráfico anexo)

☐

A avaliação confirmou a ausência de qualquer perturbação cardiovascular ou cerebrovascular grave.

- *Alguns exemplos de condição cardiovascular ou cerebrovascular grave incluem hipertensão grave, insuficiência cardíaca, doença arterial oclusiva, angina, doença cardíaca congénita hemodinamicamente significativa, cardiomiopatias, enfarte do miocárdio, arritmias potencialmente fatais e canalopatias (perturbações causadas pela disfunção dos canais iónicos), aneurisma cerebral e AVC.*

Estas são situações em que o uso de Strattera está contraindicado.

☐

Os achados iniciais da história e do exame clínico não sugerem a presença de qualquer doença cardiovascular ou cerebrovascular.

assinalar uma das caixas

☐

OU

Os achados iniciais da história e do exame clínico sugerem a presença de doença cardiovascular ou cerebrovascular, e um cardiologista aconselhou que o tratamento com Strattera pode ser iniciado sob monitorização cuidadosa.

☐

Todas as caixas devem ser verificadas antes de iniciar o tratamento ao seu doente