



**cartão**  
de **alerta** ao doente

cimzia®

## cartão de alerta ao doente

### Infecções

Cimzia aumenta o risco de contrair infecções e em doentes já com infecções estas podem progredir mais rapidamente e serem mais graves. Este risco inclui a tuberculose (TB) e a hepatite B.

#### Antes do tratamento com CIMZIA:

- não deve ser tratado se tiver uma infecção grave.
- não deve ser tratado se tem ou tiver tido uma infecção da hepatite B.
- deve fazer o rastreio da TB. É muito importante que diga ao seu médico se já teve tuberculose, ou se tiver estado em contacto com alguém que tenha tido TB.

#### Por favor, anote as datas dos últimos rastreios de TB:

Teste de tuberculina: \_\_\_\_\_

Raio-X ao tórax: \_\_\_\_\_

#### Durante o tratamento com Cimzia:

Se você desenvolver sintomas que sugiram uma infecção, tais como febre, tosse persistente, perda de peso ou apatia, procure imediatamente assistência médica.

### Interação laboratorial

Foram detectadas Interferências com determinados testes de coagulação (ensaios de coagulação) em doentes tratados com CIMZIA. Este medicamento pode erroneamente fazer com que estes testes indiquem um tempo de coagulação prolongado quando tal não existe. Este efeito foi observado com os testes PTT-LA e STA-PTT A da Diagnostica Stago e com os testes HemosIL APTT-SP líquido e HemosIL TTPA Sílica liofilizada de Instrumentation Laboratories. Outros testes aPTT podem igualmente ser afectados.

Não foram observadas interferências com os testes de tempo de trombina (TT) e de protrombina (TP). Não há nenhuma evidência de que a terapêutica com o Cimzia tenha um efeito sobre a coagulação do sangue (coagulação *in vivo*).

### Doenças Malignas

Existe um risco (apesar de baixo) de desenvolvimento de cancro, sobretudo linfoma e cancro da pele.

#### Durante o tratamento com CIMZIA:

- Se desenvolver sintomas coincidentes com os de um tumor maligno, procure imediatamente assistência médica.

### Insuficiência Cardíaca

#### Antes do tratamento com CIMZIA:

- É importante que informe o seu médico se teve ou tem um problema cardíaco grave. Não deve utilizar se tiver insuficiência cardíaca moderada ou grave.

#### Durante o tratamento com CIMZIA

- Se desenvolver sintomas de insuficiência cardíaca (por exemplo, falta de ar ou inchaço dos pés) procure imediatamente assistência médica.

### Datas do tratamento com CIMZIA

1ª Injecção: \_\_\_\_\_

Injecções seguintes: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Para mais informações consulte o Folheto Informativo.
- Por favor certifique-se que tem consigo uma lista de todos os outros medicamentos que toma em qualquer visita a um profissional de saúde.

Nome do doente: \_\_\_\_\_

Nome do médico: \_\_\_\_\_

Número de telefone do médico: \_\_\_\_\_

Conserve este cartão consigo durante 5 meses após a última dose CIMZIA, dado alguns efeitos secundários poderem ocorrer muito tempo após a última dose de CIMZIA.

Este cartão de alerta contém informações de segurança importantes de que necessita de ter conhecimento antes de lhe ser administrado e durante o tratamento com CIMZIA.

Mantenha este cartão consigo em todos os momentos e apresente-o a todos os médicos que consultar para tratamento médico.



**UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda.**

Rua Victor Câmara, Edifício D. Amélia, Piso 0, Sala A2 - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos - Portugal

Tel: +351 21 302 53 00 - Fax: +351 21 301 71 03 - NIF 500 291 322 - Linha Verde Farmacovigilância Tel: 800 205 476