

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

(Despacho n.º 5542/2004, publicado no DR, II Série, n.º 68, de 20 de Março de 2004)

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Abacavir+ Lamivudina +Zidovudina Comp.	Hosp. São Francisco Xavier SA Hosp. Cova da Beira SA	Tratamento da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH 1) <i>A indicação terapêutica proposta consta do RCM</i>	Associação de 3 anti retrovíricos da classe dos inibidores da transcriptase reversa-nucleósidos (ITR- N). Os dois hospitais referiram que a associação tem os mesmos custos que a utilização separada das 3 substâncias activas, com maior comodidade para o doente. Permite reduzir o número de comprimidos por dia. <i>Obs. – Medicamento abrangido pelo Despacho n.º 280/96, de 6 de Outubro</i>
Aceclofenac comp.	Hosp. Distrital de Lagos	Tratamento da dor <i>A indicação terapêutica proposta consta do RCM</i>	Medicamento indicado pela consulta da dor do Hosp. do Barlavento Algarvio <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Ácido Zoledrónico Pó e solvente para perfusão	IPOFG-CROL, S.A Hosp. Santa Luzia de Elvas	O IPOFG-CROL, S.A aprovou para a Neoplasia da próstata com metástases ósseas. O Hosp. Santa Luzia de Elvas aprovou para a prevenção de complicações ósseas em doentes com neoplasias em estado avançado com envolvimento ósseo e também para o tratamento da hipercalecémia por tumores. <i>As indicações propostas constam do RCM</i>	IPOFG-CROL, S.A - Neoplasia da próstata com metástases ósseas, reservado para doentes com características idênticas às que determinam a inclusão no ensaio clínico, nomeadamente: Diagnóstico de carcinoma da próstata cito ou histologicamente demonstrado; metastização óssea, resistência a uma terapia hormonal adequada, demonstrada pelo aumento da taxa sérica do PSA em 3 medições consecutivas, separadas pelo menos 2 semanas entre si; e sem necessidade de terapêutica analgésica com morfina ou fentanil. As propostas deste tratamento serão analisadas caso a caso após preenchimento de um formulário (J) . Hosp. Sta Luzia de Elvas - O Ác. Zoledrónico 4mg administrado em infusão durante 15 min. É seguro e eficaz para as indicações terapêuticas referidas. O Ác. Zoledrónico tem uma administração mais conveniente (15 min.) quando comparado com o pamidronato (2 horas).

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitalais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Adalimumab Sol. inj. 40 mg/0,8 ml	Hosp. Geral de Santo António SA	Artrite reumatóide activa moderada a grave em adultos com resposta inadequada a medicamentos anti – reumáticos modificadores da doença. <i>A indicação terapêutica proposta consta do RCM</i>	A existência de mais uma alternativa dentro do grupo dos antagonistas do TNF é útil uma vez que a resposta individual ao tratamento e a tolerância podem obrigar à mudança entre medicamentos do mesmo grupo. Está sujeito a justificação e cumprimento dos critérios definidos pela CFT (J).
Adefovir Dipivoxil Comp. 10mg	Hosp. José Joaquim Fernandes SA Hosp. Infante D. Pedro SA	Hepatite B crónica <i>A indicação terapêutica proposta consta do RCM</i>	Hosp. José Joaquim Fernandes SA – Para utilizar apenas quando comprovada a falência terapêutica com a Lamivudina 100 mg (J).
Aldesleucina Pó para solução para perfusão	Hosp. Pulido Valente SA Hosp. Garcia de Orta S.A	Carcinoma das células renais com metastização pulmonar irrecutível <i>A indicação terapêutica proposta consta do RCM</i>	Hosp. Garcia de Orta S.A - Imunomodulador que parece ter uma melhor taxa de resposta e de sobrevivência relativamente ao interferão α .
Alemtuzumab Concentrado para solução para perfusão	Hosp. Geral de Santo António SA Hosp. Garcia de Orta S.A	Tratamento de doentes com leucemia linfocítica crónica (LLC) <i>A indicação terapêutica proposta consta do RCM</i>	Hosp. Geral de Sto António SA - Tratamento de doentes com LLC, que foram tratados com agentes alquilantes e que não conseguiram uma resposta completa ou parcial. Autorizado como medicamento de utilização especial e de prescrição restrita sendo a sua utilização condicionada a um protocolo já definido (J). Hosp. Garcia de Orta S.A - Anticorpo monoclonal para tratamento de doentes com leucemia linfocítica crónica resistente à Fludarabina; autorizado para um doente.



Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Atazanavir Cápsulas	Hosp. José Joaquim Fernandes S.A. Hosp. Egas Moniz SA Hosp. de Joaquim Urbano Hosp. Distrital de Faro Hosp. Garcia de Orta S.A Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A	Hosp. Egas Moniz S.A; Hosp. de Joaquim Urbano; Hosp. Garcia de Orta S.A e Hosp. José Joaquim Fernandes S.A - Inibidor da protease para o tratamento da infecção VIH 1. Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A - Terapêutica anti-retrovírica combinada de adultos infectados pelo VIH previamente tratados com outros anti-retrovíricos e em regime boosting <i>No RCM está indicado na terapêutica anti retrovírica combinada de adultos infectados pelo VIH-1 previamente tratados com medicamentos antiretrovíricos</i>	O Hosp. Egas Moniz S.A; Hosp. de Joaquim Urbano e Hosp. Garcia de Orta S.A referem ter introduzido este medicamento por uma maior simplicidade posológica, padrão de resistência diferente dos outros IP e eficácia semelhante, menores efeitos sobre o metabolismo lipídico. O Hosp. Garcia de Orta S.A refere adicionalmente que não existem estudos a longo prazo que atestem uma menor incidência de acidentes cardiovasculares; será utilizado em doentes cumpridores com manifestos sinais de lipodistrofia, sem alternativas de outros grupos. O Hosp. Egas Moniz S.A refere adicionalmente que o custo relativo diário da sua associação com ritonavir é cerca de 5% mais dispendioso comparativamente às associações mais recentes saquinavir/ritonavir e lopinavir/ritonavir. (J) Hosp. José Joaquim Fernandes S.A. - Utilizado em substituição do Kaletra (Lopinavir + ritonavir) com uma melhor facilidade de administração (1 toma por dia) e melhor perfil lipídico. Hosp. Distrital de Faro - "Foi aprovado porque está de acordo com a legislação em vigor, Desp 280/96". <i>Obs. – medicamento abrangido pelo Despacho n.º 280/96, de 6 de Outubro</i>
Azitromicina inj e comp.	Hosp. São Sebastião S.A.	Tratamento da pneumonia adquirida na comunidade <i>A indicação terapêutica proposta consta do RCM</i>	O Hosp. de São Sebastião SA refere que a Azitromicina apresenta eficácia e tolerabilidade superior à Claritromicina, tendo a vantagem adicional de ser mais económica. Deverá ser disponibilizada, com justificação médica, como antibiótico alternativo no grupo dos macrólidos, em substituição da Claritromicina (J) .

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Bexaroteno Cáps. 75 mg	Hosp. Distrital de Faro	<i>Antineoplásico.</i> <i>A indicação terapêutica não foi especificada.</i>	Adquirido para um doente específico. É referido na acta que não existem alternativas terapêuticas.
Bisoprolol comp. 2,5mg e 5 mg	Hosp. Infante D. Pedro SA	<i>Anti hipertensor.</i> <i>A indicação terapêutica não foi especificada.</i>	É citada a existência de estudos farmacoeconómicos, mas não são referidos quais. <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Bosentan comp.	Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A Hosp. Distrital de Faro	Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A - hipertensão pulmonar. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A - tratamento de uma doente, com diagnóstico de hipertensão pulmonar, classe III, secundária à esclerodermia. Hosp. Distrital de Faro - Aquisição autorizada para um doente, de acordo com a situação clínica.
Budesonido cápsulas	Hosp. Garcia de Orta S.A	Doença de Chron de média gravidade <i>A indicação terapêutica proposta consta do RCM</i>	Importante vantagem na utilização para a Doença de Chron de média gravidade, com duração de tratamento de cerca de 3 meses. Diminuição dos efeitos adversos dos corticosteróides. <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Buprenorfina Sistema Transdérmico	Hosp. Infante D. Pedro SA Hosp. Garcia de Orta S.A	Hosp. Infante D. Pedro SA - Analgésico potente <i>No RCM está indicado para o tratamento da dor neoplásica e da dor intensa que não responde a analgésicos não opióides.</i>	Hosp. Infante D. Pedro SA - Analgésico potente utilizado quando a via oral não estiver disponível, com a vantagem de ser mais cómodo e mais barato que a administração endovenosa. Hosp. Garcia de Orta S.A – foi autorizado, mas será efectuada uma avaliação do impacto da utilização no final do ano. <i>Obs. - No FHNM existe esta substância activa mas não nesta forma farmacêutica; Medicamento participado</i>

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Capecitabina comp.	Hosp. Distrital de Faro	<i>Antineoplásico. As indicações terapêuticas não estão especificadas</i>	Aquisição autorizada para doentes específicos, de acordo com a situação clínica.
Celecoxib cápsulas	Hosp. Distrital de Lagos	<i>AINE. Indicação terapêutica não especificada</i>	Indicados pela consulta da dor do Hosp. do Barlavento Algarvio <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Cetorolac Comp. e Inj.	Hosp. de Nossa Sra da Conceição de Valongo Hosp. Geral de Sto António SA Hosp. Amato Lusitano	Hosp. de Nossa Sra da Conceição de Valongo - Analgésico Hosp. Geral de Sto António S.A e Hosp. Amato Lusitano - Tratamento de curta duração da dor aguda em situação pós operatória. <i>As indicações propostas constam do RCM</i>	Autorizado pelo Hosp. de Valongo por ter maior potência analgésica e menores efeitos no SNC que o Tenoxicam (também não pertence ao FHNM) Hosp. Amato Lusitano - Anti -inflamatório não esteróide com potentes propriedades analgésicas, sendo a sua introdução uma mais valia em situações de dor aguda pós operatória . Hosp. Geral de Sto António S.A e Hosp. Amato Lusitano têm protocolo de utilização com a duração de tratamento proposta.
Cidofovir inj.	Hosp. Distrital de Faro	<i>Antivirico. Indicação terapêutica não especificada</i>	Aquisição autorizada para 2 doentes, devido à situação clínica.

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Cinchocaína + Policresaleno supositórios	Hosp Cova da Beira SA	<i>Indicação terapêutica não especificada</i>	<i>O hospital já tem este medicamento em pomada rectal.</i> Obs. – O Medicamento foi descomparticipado.
Claritromicina Comprimidos 500 mg de libertação modificada	Hosp. Distrital de Macedo de cavaleiros	Antimicrobiano. <i>Indicação terapêutica não especificada</i>	<i>O Fundamento para a introdução não foi apresentado.</i> <i>Obs. – No FHNM existe a substância activa Claritromicina mas não em comprimidos de libertação prolongada; Medicamento comparticipado</i>
Clopidogrel comp. 75mg	Hosp. Infante D. Pedro SA	<i>Anti agregante plaquetário</i> <i>Indicação terapêutica não especificada</i>	Hosp. Infante D. Pedro SA - É citada a existência de estudos farmacoeconómicos, mas não são referidos quais. <i>Obs. - Medicamento Comparticipado</i>
Colagenase pomada	Hosp. Infante D. Pedro SA	Tratamento de úlceras de pressão <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Faz parte do protocolo da tratamento de feridas do hospital
Cola de Fibrina Dispositivo médico (Floseal)	Hosp. Pulido Valente SA Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A	Hosp. Pulido Valente SA - Nas cirurgias em situações de hemorragia grave. Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A- hemostase em vasos sanguíneos e leitos tumorais.	Hosp. Pulido Valente SA – Trata-se de um dispositivo médico indicado em cirurgia, como hemostático, em situações de hemorragia grave não controlada por processos convencionais. Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A- agente hemostático útil em neurocirurgia para hemostase em vasos sanguíneos e leitos tumorais.



Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Desflurano Líquido para inalação por vaporização	Hosp. Egas Moniz SA	Anestésico por inalação <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Pretendem posteriormente excluir um dos outros anestésicos por inalação.
Dieta Entérica com Glutamina	Hosp. Garcia de Orta S.A	Suporte nutricional em doentes com síndrome do intestino curto e doença inflamatória intestinal.	Autorizado para uma doente, como suporte nutricional em doentes com síndrome do intestino curto e doença inflamatória intestinal.
Dinoprostona Sistema de libertação vaginal	Maternidade Júlio Dinis	Na indução do trabalho de parto com ruptura prematura das membranas.	Aprovado no trabalho de parto com ruptura prematura das membranas, índice de Bishop <5.
Dipirona magnésica (Metamizol) inj. e comp.	Hosp. Pulido Valente SA Hosp. Garcia de Orta S.A Hosp. Distrital de Faro	Hosp. Distrital de Faro - Para utilização nos cuidados intensivos (Não especificada a indicação) Hosp. Pulido Valente SA - Dor aguda pós operatória e dor oncológica. <i>As indicações propostas constam do RCM</i>	Hosp. Pulido Valente SA - Após ponderação das reacções adversas da dipirona, foi considerada necessária a introdução deste analgésico para dor oncológica e pós operatória. Hosp. Garcia de Orta S.A - Já existe a apresentação endovenosa, utilizada com bons resultados. A formulação oral permite a mudança de via de administração ainda em internamento <i>Obs. - Medicamento Comparticipado</i>
Doxorrubicina lipossómica Pó e veículo para susp. injectável	Hosp. Garcia de Orta S.A	Tratamento do cancro da mama metastático. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Prevê-se a sua utilização em cerca de 5 doentes/ano. Vai ser estabelecido protocolo de utilização. <i>Obs. - No FHNM existe esta substância activa, mas não sob a forma de complexo de citrato de doxorrubicina encapsulado em lipossomas.</i>



Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Enfuvirtide Pó para solução injectável	Hosp. Pulido Valente SA Hosp. Egas Moniz S.A Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A	Hosp. Pulido Valente S.A - Inibidor da proteína de fusão que foi aprovado para situações muito especiais em que haja falência terapêutica aos antiretrovirais. Hosp. Egas Moniz SA - Doentes que evidenciam um padrão de multiresistência às 3 classes de fármacos disponíveis. Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A – uso em doentes adultos com infecção VIH1, já experimentados e com resistências múltiplas a fármacos anti-retrovíricos. <i>As indicações propostas constam do RCM</i>	No Hosp. Egas Moniz SA foi autorizado para 3 doentes que evidenciam um padrão de multiresistência às 3 classes de fármacos disponíveis, facto que se enquadra na indicação aprovada para esta molécula (reservado para a terapêutica <i>salvage</i> , associado a 2 fármacos activos) e não havendo outra opção. Uma vez que este fármaco se inclui numa nova classe terapêutica (inibidores da fusão) cuja cedência gratuita para os doentes VIH ainda não se encontra legislada, a CFT vai dar conhecimento do seu parecer ao Conselho de administração, bem como do impacto económico resultante da sua aquisição (J) . Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A – uso em doentes adultos com infecção VIH 1, já experimentados e com resistências múltiplas a fármacos anti-retrovíricos. É usado nestes doentes associado à terapêutica anti-retrovírica de base optimizada. Autorizado caso a caso (J) . <i>Obs.– Este medicamento não está abrangido pelo Despacho n.º 280/96, de 6 de Outubro</i>
Entricitabina Cáps. 200mg	Hosp. Distrital de Faro Hosp. Garcia de Orta S.A Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A	Hosp. Garcia de Orta S.A - Utilizado nos doentes com carga viral inferior a 50 cópias e sujeitos a tratamento com Lamivudina 1X/dia. Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A- fármaco de primeira linha em doentes pediátricos e adultos, naives ou em regimes alternativos em terapêutica anti-retrovírica combinada. Tem acção terapêutica no VHB sendo um dos fármacos de eleição em doentes com infecção VIH/VHB. <i>Indicação aprovada no RCM - tratamento de adultos e crianças infectados com o VIH 1 em associação com outros agentes antiretrovirais</i>	Hosp. Distrital de Faro - “Foi aprovado porque está de acordo com a legislação em vigor, Desp 280/96”. Hosp. Garcia de Orta S.A - Análogo da Citosina que será utilizado nos doentes com carga viral < 50 cópias e sujeitos a tratamento com lamivudina 1X/dia. Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A- fármaco de primeira linha em doentes pediátricos e adultos, naives ou em regimes alternativos em terapêuticas anti-retrovírica combinada. Tem acção terapêutica no VHB sendo um dos fármacos de eleição em doentes com infecção VIH/VHB <i>Observação – medicamento abrangido pelo Despacho n.º 280/96, de 6 de Outubro</i>

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Eritropoietina 30MI Pó e solvente para sol. injectável	Hosp. Egas Moniz SA	Na anemia do doente com cancro do pulmão <i>A indicação está incluída nas indicações aprovadas no RCM</i>	Na anemia do doente com cancro do pulmão
Ertapenem Pó para solução para perfusão	Hosp S. Gonçalo SA Hosp. Distrital de Chaves Hosp. Egas Moniz SA Hosp. Infante D. Pedro S.A Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A	Os quatro primeiros hospitais referem a utilização em infecções intra abdominais, quando causadas por bactérias com susceptibilidade conhecida. Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A – início do tratamento empírico das infecções intra abdominais para ser utilizado em situações agudas: perfurações gastrointestinais, colecistites ou apendicites agudas, gangrenosas, abscessos intra abdominais. <i>As indicações propostas constam do RCM</i>	Hosp. Egas Moniz SA - Uso restrito a infecções intra abdominais, quando causadas por bactérias com susceptibilidade conhecida (J). O Hosp. Egas Moniz S.A refere adicionalmente que só deve ser utilizado quando for necessária terapêutica por via parentérica e nunca em profilaxia cirúrgica. Dada a escassez de dados sobre o desenvolvimento potencial de estirpes microbianas com resistência cruzada com os carbapenemes disponíveis, o fármaco será sujeito a reavaliação no período de 1 ano. O Hosp. Distrital de Chaves menciona que o ertapenem tem a vantagem de permitir uma administração única diária e tem um custo de tratamento dia inferior ao imipenem, meropenem e piperacilina/tazobactam. Apresenta a mesma actividade que o meropenem e o imipenem para a maioria das espécies, sendo menos activo contra bactérias não fermentadoras como Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter spp. Uso restrito a infecções intra abdominais, incluindo as ginecológicas (J). Hosp S. Gonçalo SA – Analisando as propriedades microbiológicas, farmacocinéticas e os custos de aquisição, a sua aprovação só se justifica na “administração exclusivamente sob justificação clínica no tratamento das infecções intra abdominais” (J). Vai ser monitorizada a sua utilização de acordo com protocolo. Hosp. Infante D. Pedro S.A – Após avaliar as propriedades microbiológicas, farmacocinéticas e os menores custos deste fármaco, quando comparado com o Imipenem e Piperacilina +tazobactam, decidiu criar um stock de Ertapenem, mantendo a necessidade de justificação extra-formulário (J). Na Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A é para ser utilizado em situações agudas: perfurações gastrointestinais, colecistites ou apendicites agudas, gangrenosas, abscessos intra abdominais (J) .

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Estradiol 50ug/24h Disco	Hosp. Distrital de Lagos	Utilização após remoção cirúrgica dos ovários das pacientes <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Utilização após remoção cirúrgica dos ovários das pacientes. <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Exemestano comp. de 25 mg	Hosp. Pulido Valente SA	Tratamento hormonal de 2ª linha do cancro de mama metastizado <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	<i>Obs. - Medicamento participado</i>
Factor Recombinante VII	Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A	Tratamento da coagulopatia hemorrágica. <i>A indicação proposta consta do RCM.</i>	Primeira e principal indicação é o tratamento de doentes hemofílicos com inibidores circulantes de coagulação. Pode também ser utilizado na hemorragia não controlada e que não cede à terapêutica de substituição clássica com outros factores de coagulação.
Felodipina comp.	Hosp. Infante D. Pedro SA	Anti hipertensor e anti isquémico. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Antagonista dos canais de Cálcio. Foi autorizado por não interferir na frequência cardíaca, por comparação com os outros antagonistas dos canais de Cálcio <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Ferucarbotran Produto de contraste	Hosp. Geral de Sto António SA	Como contraste na ressonância magnética na detecção e caracterização de lesões focais hepáticas.	O serviço de radiologia já tem experiência com o produto. Como contraste na ressonância magnética na detecção e caracterização de lesões focais hepáticas, quando do exame sem meios de contraste resultaram achados duvidosos.
Fludarabina comp.	Hosp. Garcia de Orta S.A	Tratamento da leucemia linfocitária crónica e Linfomas não Hodgkin. <i>O tratamento da leucemia linfocítica crónica das células B consta do RCM</i>	Apresenta sensivelmente os mesmos custos que a apresentação endovenosa com a vantagem da facilidade de administração que permite a não utilização do hospital de dia. <i>Obs.- No FHNM existe esta substância activa mas não nesta forma farmacêutica; Medicamento de Autorização Especial de Utilização</i>

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Fondaparinux sol. injectável	Hosp. Garcia de Orta S.A	Profilaxia da doença tromboembólica venosa no joelho e na anca. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Requer justificação clínica (J).
Fotemustina Pó e solv. para solução injectável	Hosp. Distrital de Faro	<i>Antineoplásico.</i> <i>Indicação terapêutica não especificada</i>	Aquisição autorizada para 2 doentes, de acordo com a situação clínica.
Gabapentina cápsulas	Hosp. Distrital de Lagos	<i>Indicação terapêutica não especificada</i>	Indicados pela consulta da dor do Hosp. do Barlavento Algarvio <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Glatiramer, Acetato Pó e solv. para solução injectável	Hosp. Distrital de Bragança, S.A.	Esclerose múltipla. Forma recidiva remitente <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Experiência clínica com o fármaco com diminuição do número de recidivas. O hospital não tinha medicamentos para o tratamento da esclerose múltipla. São referidas as reacções adversas e as precauções a tomar. <i>Participado a 100% ao abrigo do Despacho nº 11 728/2004</i>
Gliclazida 30mg LM Comp. de libertação modificada	Hosp. Distrital de Bragança, S.A. Hosp. Distrital de Macedo de cavaleiros	Hosp. Distrital de Bragança, S.A.- Diabetes Mellitus Tipo 2. Hosp. Distrital de Macedo de Cavaleiros não especifica a indicação. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Hosp. Distrital de Bragança, S.A.- comprimidos de libertação modificada que permitem uma libertação faseada da substância. Vantagens: toma única diária; ausência de hipoglicémias, nomeadamente nocturnas. Maior segurança e menos efeitos laterais. Face aos estudos apresentados e às vantagens descritas pelos clínicos, o medicamento apresenta uma boa relação custo/benefício. <i>Obs. - A substância activa pertence ao FHNM, mas não nesta apresentação; Medicamento participado</i>

Medicamentos não inseridos no FNNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Granisetron inj. e comp	Hosp. Cova de Beira SA	Tratamento da emese induzida pela quimioterapia <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Aprovado para uso restrito no tratamento da emese induzida pela quimioterapia da doença de Hogkins (J).
Hexafluoreto de Enxofre	Hosp. Garcia de Orta S.A	Produto de contraste ecográfico para fins de diagnóstico.	Permite a realização de ecografias hepáticas evitando a realização de exames mais caros (TAC/ Ressonância). Não substitui nenhum meio de contraste existente no hospital.
Ibandronato de Sódio Concentrado para solução para perfusão; comprimidos	Hosp. Garcia de Orta S.A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, S.A	Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A –útil para tratamento de doentes com cancro da mama e metástases ósseas que não estão a fazer quimioterapia. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Hosp. Garcia de Orta S.A - O Ibandronato de Sódio parece ser mais eficaz que o Clodronato e tem um custo inferior. Inclusão do Ibandronato em substituição do Clodronato. Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A – A formulação oral é particularmente útil para tratamento de doentes com cancro da mama e metástases ósseas que não estão a fazer quimioterapia dispensando, desta forma, a sua deslocação ao hospital para tratamento endovenoso.
Iloprost sol. para inalação	Hosp. Garcia de Orta S.A	Hipertensão pulmonar <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Nova apresentação com diluição preparada para nebulização, com custo sobreponível às ampolas, já existentes neste hospital.
Imatinib comp. revestido doseado a 100 e 400mg.	Hosp. Distrital de Faro Hosp. Cova da Beira, S.A. Hosp. Distrital de Bragança, S.A.	Hosp. Distrital de Bragança, S.A. – leucemia mielóide crónica. <i>A indicação proposta consta do RCM</i> Hosp. Distrital de Faro e Hosp. Cova da Beira, S.A. não especificaram a indicação terapêutica.	Hosp. Distrital de Faro - Aquisição autorizada para 2 doentes, devido à situação clinica. Hosp Cova da Beira SA - Autorizada uma nova dosagem – 400mg- para facilitar a adesão à terapêutica, uma vez que a de 100mg já estava autorizada. Hosp. Distrital de Bragança, S.A. - Autorizada a dosagem de 100mg. Vantagem nos doentes com “S. Dermatiosite-like” secundário à toma de hidroxiureia. São referidas as reacções adversas e as precauções a tomar.

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Lamivudina + Zidovudina comprimidos	Hosp. Cova da Beira SA	Em substituição das duas substâncias activas isoladas	Em substituição das duas substâncias activas isoladas. Associação que facilita a adesão à terapêutica <i>Obs. – medicamento abrangido pelo Despacho n.º 280/96, de 6 de Outubro. As duas substâncias activas pertencem ao FHNM, mas não a associação.</i>
Leflunomida comp. revestido	Hosp. de São Sebastião S.A.	Tratamento da Artrite reumatóide <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Na Artrite reumatóide, como alternativa ao Metotrexato, antes do tratamento com anti-TNF. Autorizado mediante justificação caso a caso e após avaliação do CA (J). <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Leuprolide Trimestral Pó e veículo para susp. injectável	Hosp. Egas Moniz SA	Carcinoma da próstata <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Hosp. Egas Moniz SA - Em substituição do leuprolide mensal. Pretendem reavaliar os outros análogos LHRH
Levobupivacaína Sol. para perfusão	Hosp. São Paulo-Serpa	Anestésico Local <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Perfil de segurança superior ao da bupivacaína, nomeadamente no que se refere à toxicidade cardiovascular e ao nível do SNC (fonte: ADIS Drug Evaluation). Prevê-se que a sua utilização diminuirá o consumo de bupivacaína sem aumento de custos.
Levofloxacina Comp. e inj.	Hosp. Infante D. Pedro SA Hosp. Distrital de Chaves	Hosp. Infante D. Pedro SA e Hosp. Distrital de Chaves - Tratamento da pneumonia grave adquirida na comunidade <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Hosp. Infante D. Pedro SA - Foi considerado tratar-se de uma mais valia com vantagens económicas mas não se especifica qual o comparador. No Hosp. Distrital de Chaves já existe a forma injectável, tendo sido introduzidos os comprimidos.

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Lidocaína+ clorhexidina gel	Hosp. Distrital de Bragança, S.A. Hosp. de São Sebastião S.A.	Hosp. Distrital de Bragança, S.A.- lubrificante e anestésico com acção anti-séptica, para instilação uretral. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Hosp. Distrital de Bragança, S.A- comparativamente aos medicamentos existentes no formulário tem a vantagem de diminuir a probabilidade de infecção após instrumentação uretral mais lubrificação.
Lopinavir + Ritonavir cápsulas	Hosp. Cova da Beira SA	Tratamento de 2ª linha de doentes refractários aos antiretrovirais já existentes. <i>No RCM está indicado para o tratamento da infecção pelo VIH 1, em combinação com outros antiretrovirais.</i>	Tratamento de 2ª linha de doentes refractários aos antiretrovirais já existentes <i>Observação – medicamento abrangido pelo Despacho n.º 280/96, de 6 de Outubro</i>
Meropenem inj.	Hosp. Infante D. Pedro SA	Antibiótico com espectro semelhante ao do Imipenem	Antibiótico com espectro de acção semelhante ao Imipenem, com muito baixa incidência de efeitos colaterais e apresenta vantagens económicas em comparação com o Imipenem.
Nicorandil Comp.	Hosp. Infante D. Pedro SA	Vasodilatador, anti isquémico e activador dos canais de potássio, utilizado na angina de peito. <i>No RCM está indicado para a prevenção e tratamento da angina de peito</i>	A ser utilizado na angina de peito em alternativa aos nitratos por apresentarem menores efeitos adversos. <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Olanzapina inj.	Hosp. Amato Lusitano Hosp. Psiq. do Lorrvão	Hosp. Amato Lusitano - Neuroléptico atípico indicado nas perturbações esquizofrénicas e doença afectiva bipolar. Hosp. Psiq. do Lorrvão- antipsicótico atípico. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Os Hospitais já possuíam esta DCI em formulações orais e com bons resultados. O Hosp. Amato Lusitano necessita da formulação injectável para situações de urgência e/ou quando o doente não está colaborante. Foi ponderado o alerta do Infarmed relativamente à utilização deste fármaco, Hosp. Psiq. do Lorrvão – atendendo à utilidade na prática clínica e aos bons resultados obtidos com o fármaco na apresentação oral

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Omeprazole Pó para solução para perfusão 40mg	Hosp. de São Sebastião S.A.	Tratamento das úlceras pépticas Forrest I (hemorragias activas) e Forrest IIa (vaso visível) <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	As vantagens em relação à administração por bólus verificam-se em situações de úlceras pépticas, em que existe vantagem em se ter um Ph>6. Estas situações são as úlceras pépticas Forrest I (hemorragias activas) e Forrest IIa (vaso visível). Autorizado apenas para estas indicações mediante a apresentação de justificação clínica (J). <i>Obs. –Esta substância activa já pertence ao FHNM, mas não nesta forma farmacêutica</i>
Ondansetron Comp. dispersíveis	Hosp. Garcia de Orta S.A	Anti emético <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Autorizada a nova apresentação em comprimido dispersível. Estes não necessitam de água para a deglutição e o CTD é inferior. Substitui o tropisetron <i>Obs. –Esta substância activa já pertence ao FHNM, mas não nesta forma farmacêutica</i>
Oxaliplatina Pó para solução para perfusão	Hosp. Distrital de Faro	<i>Anti neoplásico</i> <i>A indicação terapêutica não foi especificada</i>	Aquisição autorizada para doentes específicos, justificado pela situação clínica dos mesmos. <i>Medicamento de Autorização Especial de Utilização</i>
Pantoprazole Pó para solução injectável	Hosp. Psiq. do Lorvão	<i>Inibidor da Bomba de protões (ATPase H⁺/K⁺)</i>	Menores interações medicamentosas que os medicamentos da mesma classe terapêutica.
Paracetamol+ Tiocolquicosido comp.	Hosp. Distrital de Lagos	<i>Indicação terapêutica não especificada</i>	Medicamento indicado pela consulta da dor do Hosp. do Barlavento Algarvio <i>Obs. -Medicamento <u>Descomparticipado</u></i>
Parecoxib Pó para solução injectável	Hosp. de Nossa Sra da Conceição de Valongo Hosp. Geral de Sto António SA	Hosp. de Nossa Sra da Conceição de Valongo e Hosp. Geral de Sto António SA - Tratamento de curta duração da dor aguda pós operatória <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Autorizado pelo Hosp. de Valongo por ser um analgésico potente não opiáceo, permitindo reduzir a quantidade de opiáceos prescritos. Hosp. Geral de Sto António S.A tem protocolo de utilização para o Parecoxib

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Pegfilgastrim Sol. injectável	Hosp. Geral de Santo António SA Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A	Hosp. Geral de Santo António SA e Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A - Tratamento da neutropenia associada à quimioterapia <i>As indicações propostas constam do RCM</i>	Hosp. Geral de Sto António SA - Permite que seja feita uma única administração por ciclo, sendo o fármaco removido quando se dá a recuperação dos neutrófilos. Requer justificação referindo a indicação terapêutica constante do RCM e quando haja uma previsão de utilização de filgastrim igual ou superior a dez dias (J). Unid. Local de Saúde de Matosinhos, S.A- para uso em casos seleccionados, como sejam doentes com imunossupressão de base (pre-HIV) que têm associada doença oncológica, ou então doentes com necessidade de esquemas de quimioterapia mais intensiva (J).
Peginterferão α- 2a 100μg Sol. Injectável	Hosp. Cova da Beira SA	Tratamento da hepatite C em doentes co infectados por HIV/HCV. <i>No RCM está indicado para o tratamento da Hepatite C crónica, não especificando doentes co infectados por HIV/HCV.</i>	Maior eficácia no tratamento da hepatite C em doentes co infectados por HIV/HCV relativamente ao peginterferão α - 2b já existente no hospital. <i>Obs. - Medicamento participado ao abrigo da portaria 1522/2003 (2ª série);</i>
Quetiapina Comprimido revestido	Hosp. São Francisco Xavier S.A.	Utilização quer nos processos agudos das perturbações psicóticas, quer na terapêutica de manutenção. <i>No RCM está indicado para o tratamento da esquizofrenia e de episódios maníacos moderados a graves.</i>	A quetiapina apresenta eficácia comparável aos antipsicóticos atípicos, apresentando, no entanto, melhor perfil de reacções adversas. Os custos inerentes ao uso de quetiapina são 1.16 vezes inferiores aos da risperidona e 2 vezes inferiores aos da Olanzapina na esquizofrenia, e 1.6 vezes superiores aos da risperidona e 1.4 vezes inferiores aos da Olanzapina no tratamento de episódios maníacos. <i>Obs. - Medicamento participado</i>

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Ramipril Comp. ou cáps.	Hosp. Pulido Valente SA	É um IECA com todas as aplicações dos da sua classe.	Vantagem de reduzir de uma forma importante a mortalidade cardiovascular, o enfarte agudo do miocárdio, e os acidentes vasculares cerebrais em doentes com evidência de doença cardiovascular, diabetes mellitus ou outros factores de risco (Estudo HOPE, NEJM, 2003) <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Risperidona comp.	Hosp. Distrital de Chaves	Tratamento de alterações comportamentais dos doentes com demência, nomeadamente idosos. <i>A indicação proposta consta do RCM. Nas indicações não é referido especificamente o caso dos idosos.</i>	Apesar de já existir no formulário hospitalar um neuroléptico atípico- a clozapina, este obriga a um controlo hematológico apertado devido ao risco de agranulocitose. <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Sertralina comp.	Hosp. Amato Lusitano	Antidepressivo com indicação no stress pós traumático e nos idosos <i>Consta do RCM a indicação no stress pós traumático</i>	Antidepressivo, inibidor selectivo da recaptção da serotonina, parece exibir menor risco de interacções medicamentosas, por inibição do citocromo P450 2D6. Vantagens em duas situações bem definidas: no stress pós traumático e nos idosos <i>Obs. - Medicamento participado</i>
Tegafur+ Uramustina comp.	Hosp. Distrital de Faro	Anti neoplásico. <i>Indicação terapêutica não especificada</i>	Necessário devido à situação clinica dos doentes (Autorizado para 5 doentes, referidos em acta).
Temozolamida cápsulas	Hosp. Distrital de Faro	Anti neoplásico. <i>Indicação terapêutica não especificada</i>	Necessário devido à situação clinica dos doentes (Autorizado para 4 doentes, referidos em acta).

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Tenecteplase Pó e solv. para sol. injectável	Hosp. Distrital de Chaves	Terapêutica de reperfusão nos doentes com enfarte agudo do miocárdio.	O tenecteplase apresenta vantagens relativamente ao alteplase quanto à eficácia e segurança, sem aumento de custos. Foi excluído o Alteplase do formulário.
Tenofovir Comp. revestido	Hosp. Cova da Beira SA Hosp. São Francisco Xavier, S. A	Hosp. Cova da Beira SA - Tratamento de 2ª linha de doentes refractários aos antiretrovirais já existentes. Hosp. São Francisco Xavier, S. A – Indicado para novos esquemas terapêuticos em doentes VIH-1 em estadios avançados e como resgate de outras terapêuticas. <i>Indicado em associação com outros fármacos anti retrovirais para o tratamento de adultos infectados com VIH-1(RCM)</i>	Hosp Cova da Beira SA - Tratamento de 2ª linha de doentes refractários aos antiretrovirais já existentes. Hosp. São Francisco Xavier, S. A – Considerando que o tenofovir demonstrou em diversos estudos eficácia em doentes que apresentam resistências a outros inibidores da transcriptase reversa; que a sua comodidade de administração é superior à da Zidovudina e da Estavudina; apesar dos custos inerentes à sua utilização serem superiores aos da Zidovudina e da Estavudina, a CFT aprovou a utilização nas indicações terapêuticas propostas. <i>Observação – medicamento abrangido pelo Despacho n.º 280/96, de 6 de Outubro</i>
Terlipressina Pó e solv. para sol. injectável	Hosp. Garcia de Orta S.A	Tratamento de hemorragias digestivas altas por varizes esofágicas e síndrome hepato-renal <i>A indicação para o tratamento da síndrome hepato-renal não consta do RCM</i>	Não existe grande evidência de aumento de eficácia da terlipressina no tratamento de varizes esofágicas. Autorizado apenas para síndrome hepato renal, indicação não aprovada no RCM, após autorização pela comissão de ética.

Medicamentos não inseridos no FHNM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Timolol 0.25% Colírio	Hosp Cova da Beira SA	<i>Já tinham esta substância activa. Introduziram uma nova dosagem.</i>	Já têm esta substância activa, introduziram uma nova dosagem. <i>Obs. –Esta substância activa já pertence ao FHNM, mas não nesta dosagem</i> <i>Medicamento participado</i>
Triantine	Hosp. Maria Pia	Doença de Wilson	<i>Medicamento de Autorização Especial de Utilização</i>
Triptorelina 11.25 Pó e solv. para sol. injectável	IPOFG-CROL, S.A	Utilização trimestral no tratamento do cancro da próstata <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Foi definido pelo IPO a Triptorelina como agonista LH-RH padrão, de utilização trimestral.
Tobramicina Sol. para inalação por nebulização	Hosp. de São Sebastião SA Hosp. Pulido Valente SA	Hosp. de São Sebastião SA – Num doente com síndrome da discenia dos cílios com infecção permanente por pseudomonas aeruginosa Hosp. Pulido Valente SA - Profilaxia e tratamento de bronquiectasias infectadas por pseudomonas aeruginosa em doentes com Fibrose quística. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Hosp. de São Sebastião SA - Autorizado para um doente específico com síndrome da discenia dos cílios, com extensas bronquiectasias e broncorreia permanente, com colonização/ infecção permanente por pseudomonas aeruginosa. Em alternativa à Colistina.

Medicamentos não inseridos no FHM introduzidos pelas CFT

Medicamento	Hospital	Indicações terapêuticas propostas pelos hospitais	Resumo do fundamento apresentado para a introdução
Valganciclovir comprimido	Hosp. Distrital de Faro Hosp. Cova da Beira SA Hosp. Garcia de Orta S.A	Hosp Cova da Beira S.A - Tratamento de situações de infecção a CMV. Hosp. Garcia de Orta S.A - Tratamento de situações de infecção a CMV. Existe indicação aprovada em RCM para prevenção de doença causada por CMV, em indivíduos CMV negativos submetidos a transplante de dador CMV positivo. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Hosp Cova da Beira S.A - Tratamento de situações de infecção a CMV por não existir alternativa terapêutica para o efeito. Hosp. Garcia de Orta S.A – Autorizada a inclusão no formulário para substituição do ganciclovir. A prescrição é sujeita a justificação obrigatória (J). É efectuada comparação do custo de tratamento por doente entre o Valganciclovir comp. de 450mg e o Ganciclovir ampolas. Hosp. Distrital de Faro - Necessário devido à situação clínica do doente (autorizado para 1 doente).
Voriconazol comprimido	Hosp. Garcia de Orta S.A	Infecção intra abdominal por Candida pseudotropicalis. <i>A indicação proposta consta do RCM</i>	Autorizado para um doente. Está a fazer anfotericina. Pretendem dar alta ao doente com a passagem para o Voriconazol oral.

As observações escritas em itálico e verde foram efectuadas pelo Observatório do Medicamento e Produtos de Saúde

(J) – Autorizado, mas é exigida uma justificação para a sua utilização.