



## Atualizações ao Formulário Nacional do Medicamento

No 2º quadrimestre de 2026, a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) aprovou em sede de reunião plenária a inclusão e posicionamento dos seguintes medicamentos /indicações terapêuticas no Formulário Nacional de Medicamentos (FNM).

| Denominação Comum Internacional (DCI) | Âmbito de Utilização | Grupo Terapêutico            | Indicação(ões) de utilização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Abaloparatida</a>         | Ambulatório          | Osteoporose                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tratamento de osteoporose grave com risco iminente de fratura em mulheres pós-menopausa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Acoramidis</a>            | Hospitalar           | Amiloidose                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Tratamento da amiloidose associada à transtirretina de tipo selvagem ou variante em doentes adultos com miocardiopatia (ATTR-CM).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Alectinib</a>             | Hospitalar           | Oncologia - Cancro do Pulmão | <ul style="list-style-type: none"><li>Em monoterapia, como tratamento adjuvante, após ressecção completa do tumor, em doentes adultos com CPNPC ALK-positivo com elevado risco de recidiva.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">Diflunisal</a>            | Hospitalar           | Amiloidose                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Tratamento da amiloidose hereditária mediada por transtirretina (amiloidose ATTRh) em doentes adultos com polineuropatia de estágio 1 ou de estágio 2.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">Durvalumab</a>            | Hospitalar           | Oncologia - Cancro do Pulmão | <ul style="list-style-type: none"><li>Em associação com etoposido e carboplatina ou cisplatina para o tratamento em primeira linha em adultos com cancro do pulmão de pequenas células, doença extensa (CPPC-DE).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Efgartigimod alfa</a>     | Hospitalar           | Miastenia Gravis             | <ul style="list-style-type: none"><li>Suplemento à terapêutica padrão para o tratamento de doentes adultos com Miastenia Gravis generalizada (gMG) com positividade para os anticorpos anti-recetores da acetilcolina (AChR).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">Enfortumab vedotina</a>   | Hospitalar           | Oncologia - Cancro urotelial | <ul style="list-style-type: none"><li>Em monoterapia para o tratamento de doentes adultos com cancro urotelial metastático ou localmente avançado previamente tratados com quimioterapia contendo platina e um inibidor do recetor de morte celular programada 1 ou do ligando de morte celular programada 1.</li><li>Em combinação com pembrolizumab, é indicado para o tratamento de primeira linha de doentes adultos com cancro urotelial metastático ou irresssecável que são elegíveis para quimioterapia contendo platina.</li></ul> |

| Denominação Comum Internacional (DCI)                                  | Âmbito de Utilização | Grupo Terapêutico              | Indicação(ões) de utilização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Eplontersen</a>                                            | Hospitalar           | Amiloidose                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento de doentes com amiloidose hereditária mediada por transtirretina (hATTR) no estadio 2 de polineuropatia e doentes no estadio 1 que não respondem, apresentam intolerância ou não são elegíveis para o tratamento farmacológico prévio com tafamidis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">Erdafitinib</a>                                            | Hospitalar           | Oncologia - Cancro urotelial   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento de doentes adultos com carcinoma urotelial (CU) irressecável ou metastático, com alterações genéticas suscetíveis no gene FGFR3, que tenham recebido, pelo menos, uma linha de tratamento anterior contendo um inibidor PD-1 ou PD-L1, no contexto de tratamento de tumores irressecáveis ou metastáticos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Escetamina</a>                                             | Hospitalar           | Antidepressivos                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em associação com um Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) ou Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSN), é indicado para adultos com Perturbação Depressiva Major resistente ao tratamento, que não responderam a pelo menos três tratamentos diferentes com antidepressivos, com estratégias de combinação ou potenciação oral, no episódio depressivo atual moderado a grave, que tenham realizado previamente psicoterapia e tenham resistência à terapêutica com eletroconvulsivoterapia, contra-indicação, não tenham acesso ou que tenham recusado esta terapêutica.</li> </ul> |
| <a href="#">Germânio (68Ge) tetracloreto + Gálio (68Ga) tricloreto</a> | Hospitalar           | Radiofármaco                   | Este medicamento não se destina a ser usado diretamente em doentes. O eluato do gerador de radionuclídeos (solução de cloreto de gálio [68Ga]) é indicado para radiomarcagem in vitro de vários conjuntos para preparações radiofarmacêuticas desenvolvidos e aprovados para serem radiomarcados com esta solução, para utilização em tomografia por emissão de positrões (PET).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Inclisiran</a>                                             | Hospitalar           | Antidislipidémicos             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento de adultos com hipercolesterolemia primária (familiar heterozigótica e não familiar) ou dislipidemia mista, com doença cardiovascular aterosclerótica (prevenção secundária), como complemento à dieta: em combinação com uma estatina ou uma estatina com outras terapêuticas hipolipemiantes em doentes que não atingem os valores recomendados de C-LDL com a dose máxima tolerada de estatina; ou isoladamente ou em combinação com outras terapêuticas hipolipemiantes em doentes intolerantes a estatinas, ou nos quais as estatinas estejam contra-indicadas.</li> </ul>                                  |
| <a href="#">Lebricizumab</a>                                           | Hospitalar           | Biológicos - Dermatite atópica | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento da dermatite atópica moderada a grave em adultos e adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos com um peso corporal mínimo de 40 kg que sejam candidatos a terapêutica sistémica e com resposta inadequada ou não elegíveis para imunossuppressores sistémicos convencionais.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">Letermovir</a>                                             | Hospitalar           | Medicamentos Anti-infecciosos  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profilaxia da doença por citomegalovírus (CMV) em adultos CMV- negativos que tenham recebido um transplante renal de um dador CMV-positivo-, não elegíveis para valganciclovir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Denominação Comum Internacional (DCI)  | Âmbito de Utilização | Grupo Terapêutico                   | Indicação(ões) de utilização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Liraglutido</a>            | Ambulatório          | Diabetes <i>mellitus</i> tipo 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento de adultos com diabetes <i>mellitus</i> tipo 2 insuficientemente controlada com IMC igual ou superior a 30 kg/m<sup>2</sup> ou risco elevado de doença cardiovascular, como adjuvante à dieta e exercício, em adição a outros medicamentos para o tratamento da diabetes, para ser utilizado em 2ª e 3ª linhas terapêuticas.</li> </ul>                                                               |
| <a href="#">Marstacimab</a>            | Hospitalar           | Hemostáticos                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profilaxia de rotina de episódios hemorrágicos em doentes com idade igual ou superior a 12 anos, com um peso mínimo de 35 kg, com: <ul style="list-style-type: none"> <li>hemofilia A grave (deficiência congénita de fator VIII, FVIII &lt; 1%) sem inibidores do fator VIII, ou</li> <li>hemofilia B grave (deficiência congénita de fator IX, FIX &lt; 1%) sem inibidores do fator IX.</li> </ul> </li> </ul> |
| <a href="#">Mavacamten</a>             | Hospitalar           | Miocardiopatia                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento da miocardiopatia obstrutiva hipertrófica (MCOH) sintomática (New York Heart Association, NYHA classes II-III) em doentes adultos que tiveram uma resposta inadequada/insuficiente ou que apresentam contra-indicação ou intolerância a beta bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio.</li> </ul>                                                                                              |
| <a href="#">Miricizumab</a>            | Hospitalar           | Biológicos - Doença de Crohn        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento de doentes adultos com doença de Crohn ativa moderada a grave que tenham tido uma resposta inadequada, perda de resposta, ou que tenham sido intolerantes à terapêutica convencional ou a tratamento biológico anti-TNF.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Miricizumab</a>            | Hospitalar           | Biológicos - Colite ulcerosa        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento de doentes adultos com colite ulcerosa ativa moderada a grave que tenham tido uma resposta inadequada, perda de resposta, ou que tenham sido intolerantes à terapêutica convencional ou a tratamento biológico anti-TNF.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Nebivolol + Amlodipina</a> | Ambulatório          | Antihipertensores                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento da hipertensão essencial como terapia de substituição em doentes adultos adequadamente controlados com nebivolol e amlodipina administrados concomitantemente no mesmo nível de dose da combinação, mas com comprimidos separados.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Pembrolizumab</a>          | Hospitalar           | Oncologia - Cancro endométrio       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em combinação com carboplatina e paclitaxel, é indicado para o tratamento em primeira linha do carcinoma do endométrio primário avançado ou recorrente em adultos que são candidatos a terapêutica sistémica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Pembrolizumab</a>          | Hospitalar           | Oncologia - Cancro do colo do útero | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em combinação com quimiorradioterapia (radioterapia externa seguida de braquiterapia), é indicado para o tratamento de cancro do colo do útero localmente avançado estadio FIGO 2014 III - IVA em adultos que não receberam terapêutica definitiva prévia.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| <a href="#">Pembrolizumab</a>          | Hospitalar           | Oncologia - Cancro colo-rectal      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em monoterapia para o tratamento em primeira linha do cancro colorretal metastático com instabilidade de microsatélites elevada ou com deficiência de reparação de incompatibilidade, em adultos, com ECOG 0-1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

| Denominação Comum Internacional (DCI)     | Âmbito de Utilização | Grupo Terapêutico                                               | Indicação(ões) de utilização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pembrolizumab</a>             | Hospitalar           | Oncologia - Câncer cabeça e pescoço                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em monoterapia é indicado para o tratamento do carcinoma de células escamosas da cabeça e pescoço localmente avançado ressecável como tratamento neoadjuvante, continuado como tratamento adjuvante em combinação com radioterapia com ou sem cisplatina concomitante e de seguida em monoterapia em adultos cujos tumores expressam PD-L1 com CPS <math>\geq 1</math>, ECOG 0-1.</li> </ul> |
| <a href="#">Pembrolizumab</a>             | Hospitalar           | Oncologia - Câncer do Pulmão                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em combinação com quimioterapia contendo platina como tratamento neoadjuvante e, de seguida, continuado em monoterapia como tratamento adjuvante é indicado para o tratamento de carcinoma do pulmão de não pequenas células (CPNPC) ressecável com risco elevado de recorrência em adultos.</li> </ul>                                                                                      |
| <a href="#">Quizartinib</a>               | Hospitalar           | Oncologia - Leucemia Mieloide Aguda                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em combinação com regimes de quimioterapia de indução com citarabina e antraciclina e regimes de quimioterapia de consolidação com citarabina, com posterior monoterapia em terapêutica de manutenção em doentes adultos recém diagnosticados com Leucemia Mielóide Aguda (LMA) e com expressão da mutação FLT3-ITD.</li> </ul>                                                              |
| <a href="#">Semaglutido</a>               | Ambulatório          | Diabetes <i>Mellitus</i> tipo 2                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlada com IMC igual ou superior a 30 kg/m<sup>2</sup> ou risco elevado de doença cardiovascular, como adjuvante à dieta e exercício, em adição a outros medicamentos para o tratamento da diabetes, para ser utilizado em 2ª e 3ª linhas terapêuticas.</li> </ul>                                                  |
| <a href="#">Serenoa repens</a>            | Ambulatório          | Hiperplasia Benigna da Próstata                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento sintomático da hiperplasia benigna da próstata em adultos do sexo masculino.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Serplulimab</a>               | Hospitalar           | Oncologia - Câncer do Pulmão                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em associação com carboplatina e etoposido é indicado para o tratamento em primeira linha de doentes adultos com cancro do pulmão de pequenas células, doença extensa (CPPC-DE).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">Teclistamab</a>               | Hospitalar           | Oncologia - Mieloma Múltiplo                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em monoterapia no tratamento de doentes adultos diagnosticados com Mieloma Múltiplo em Recaída ou Refratário, submetidos a 3 linhas terapêuticas prévias ou superior, incluindo um agente imunomodulador, um inibidor do proteassoma e um anticorpo anti-CD38, que demonstraram progressão de doença durante a última linha terapêutica.</li> </ul>                                          |
| <a href="#">Trifluridina + Tipiracilo</a> | Hospitalar           | Oncologia - Câncer Colo-rectal                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em combinação com bevacizumab para o tratamento de doentes adultos com cancro colo-rectal (CCR) metastático que receberam previamente dois regimes terapêuticos antineoplásicos incluindo quimioterapia baseada em fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano, agentes anti-VEGF e/ou agentes anti-EGFR.</li> </ul>                                                                        |
| <a href="#">Zolbetuximab</a>              | Hospitalar           | Oncologia- Adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em combinação com quimioterapia contendo fluoropirimidina e platina, é indicado para o tratamento de primeira linha em doentes adultos com adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica (JGE) HER2-negativo, localmente avançado, irressecável ou metastático, cujos tumores são Claudina (CLDN) 18.2 positivos.</li> </ul>                                                          |

A CNFT reviu também o posicionamento no FNM dos antidiabéticos orais. Essa revisão foi aprovada em junho. Para informação mais detalhada consultar as fichas dos medicamentos disponíveis [nesta página](#).

Na sequência desta revisão, a CNFT irá atualizar a Orientação n.º 12 sobre Recomendações para a Terapêutica Farmacológica da Hiperglicémia na Diabetes Mellitus tipo 2, de março de 2022, que será publicada brevemente.

## **Pareceres e Orientações**

No 2º quadrimestre de 2026, a CNFT elaborou um Protocolo de Registo de Utilização de Andexanet alfa. O respetivo protocolo está disponível [nesta página](#).

## **Fórum CNFT da Primavera - 2026**

Em maio realizou-se o Fórum CNFT da Primavera - 2026, em modo virtual, sobre o tema "Utilização de antimicrobianos".

Este evento contou com a participação de mais de 140 profissionais de saúde, em representação das Comissões de Farmácia e Terapêutica e das Unidades Locais do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos.

As apresentações do Fórum CNFT Primavera 2026 encontram-se disponíveis [nesta página](#).

*Para mais informação sobre a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, detalhes do posicionamento de medicamentos, e outras decisões desta comissão aceda a [secção própria do site do Infarmed](#).*