

Ácido fusídico 20 mg/g
Condições MNSRM-EF
- Infecção da pele localizada causada por micro-organismos sensíveis ao ácido fusídico - Idade superior a 18 anos - Para uso externo (Uso cutâneo) - <u>Dosagem Máxima por unidade</u>: 2% (20 mg/g) - <u>Posologia</u>: aplicação local 2 a 3 vezes por dia com ou sem penso oclusivo. É recomendável um tratamento mínimo de 8 dias - <u>Dimensão Máxima da embalagem</u>: 30 g
Informação suplementar para RCM/FI e Rotulagem
Informação adicional

Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia (EF) O presente protocolo permite auxiliar o farmacêutico a dispensar o medicamento após análise, evitar a dispensa inapropriada caso não sejam cumpridas as condições estabelecidas e detetar situações que devem ser referenciada para a consulta médica.	
DCI / Dosagem	Ácido fusídico (20 mg/g)
Classe farmacológica	13. Medicamentos usados em afeções cutâneas / 13.1 Anti-infecciosos de aplicação na pele / 13.1.2 Antibacterianos
Condição Dispensa EF	Infeção da pele localizada causada por micro-organismos sensíveis ao ácido fusídico
Via de administração	Para uso externo (Uso cutâneo)

1- O FARMACÊUTICO DEVERÁ VISUALIZAR A ZONA AFETADA

2- FATORES A TER EM CONSIDERAÇÃO:

- 1- Idade
- 2- Hipersensibilidade à substância ativa ou aos excipientes
- 3- Gravidez e amamentação
- 4- Comorbilidades
- 5- Eventual medicação utilizada para Infeção da pele localizada

CONDIÇÕES DISPENSA “EF”

- Infeções da pele localizadas causadas por micro-organismos sensíveis ao ácido fusídico (ver anexo)
- Idade superior a 18 anos

CRITÉRIOS PARA REFERENCIAÇÃO PARA A CONSULTA MÉDICA:

- Idade inferior a 18 anos
- Se não tiver a certeza do diagnóstico
- Infeções em grandes áreas de pele
- Hipersensibilidade à substância ativa ou aos excipientes;
- Indivíduos com qualquer uma das patologias ou situações, mencionadas no anexo

SE CUMPRE CUMULATIVAMENTE CONDIÇÕES DISPENSA “EF” DISPENSAR O MEDICAMENTO E PRESTAR INFORMAÇÃO / RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Dosagem Máxima: 2% (20 mg/g)

Posologia: aplicação local 2 a 3 vezes por dia com ou sem penso oclusivo. É recomendável um tratamento mínimo de 8 dias.

Dimensão Máxima da embalagem: 30 g

Recomendações:

- Devem ser referidas as instruções de utilização que constam no anexo
- Caso os sintomas persistam, o doente deve recorrer ao seu médico.

CUMPRE QUALQUER UM DOS CRITÉRIOS

REFERENCIAÇÃO PARA A CONSULTA MÉDICA

Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia – Anexo Ácido fusídico	
DCI	Ácido fusídico (20 mg/g)
Classe farmacológica	13. Medicamentos usados em afeções cutâneas / 13.1 Anti-infecciosos de aplicação na pele / 13.1.2 Antibacterianos
Condição Dispensa EF	Infeção da pele localizada causada por micro-organismos sensíveis ao ácido fusídico
Via de administração	Para uso externo (Uso cutâneo)
Informação adicional à dispensa	O Ácido fusídico é um antibacteriano utilizado em Infeções da pele localizadas. Poderá o próprio utente identificar a condição ao farmacêutico, por já ter diagnóstico médico prévio. Cabe ao farmacêutico, mediante a descrição dos sintomas por parte do utente, e visualização da zona afetada, analisar se a situação se enquadra na situação abaixo descrita. Caso existam dúvidas, o farmacêutico deverá proceder a referência a consulta médica. <u>O medicamento apenas deve se dispensado nas situações abaixo descritas:</u> Infeções da pele localizadas, tais como furúnculos, impetigos, piodermite, abscessos, foliculites, acne infetado e feridas. Normalmente estas infeções são causadas por estafilococos, estreptococos ou outros organismos sensíveis ao ácido fusídico. <u>Se a infeção afetar uma grande área da pele, o utente deve ser reencaminhado para o médico.</u> <u>Furúnculos:</u> Áreas dolorosas, inflamadas e salientes originadas por uma infeção por <i>Staphylococcus</i> à volta dos folículos pilosos. Os furúnculos têm frequentemente pus no centro. Regra geral, expulsam um exsudado esbranquiçado, ligeiramente sanguinolento. <u>Impétigo:</u> Infeção cutânea causada por <i>Staphylococcus</i> ou por <i>Streptococcus</i>, que se caracteriza pela formação de pequenas vesículas cheias de pus (pústulas). Esta doença afeta principalmente as crianças e pode aparecer em qualquer parte do corpo, embora seja mais frequente na cara, nos braços e nas pernas. As vesículas podem ser do tamanho de uma ervilha ou como grandes anéis. <u>Piodermite:</u> Infeção causada por <i>Staphylococcus</i> e <i>Streptococcus</i> com características semelhantes ao impetigo. <u>Abscessos:</u> Infeção cutânea causada por <i>Staphylococcus</i>, que se manifestam como saliências quentes cheias de pus, localizadas por baixo da superfície cutânea. Em geral rebentam como o faria uma espinha de considerável volume e o pus espalha-se sobre a pele, daí poderem verificar-se mais infeções se não se limpar de imediato <u>Foliculite:</u> Inflamação dos folículos pilosos causada por uma infeção por <i>Staphylococcus</i>. <u>Acne infetado:</u> Doença cutânea frequente, causada pela obstrução dos poros da pele, com a consequente formação de espinhas e abscessos inflamados e infetados (acumulação de pus). O medicamento não pode ser aplicado nas seguintes zonas/situações: -Grandes áreas infetadas - Região ocular
Patologias ou situações em que é contraindicada ou não recomendada a associação Ácido fusídico	- Gravidez e amamentação
Interações medicamentosas	As interações com medicamentos administrados sistemicamente são consideradas mínimas, uma vez que a absorção sistémica do ácido fusídico tópico é negligenciável
Referências	-RCM's: Fucidine Creme e pomada; Corifium creme; Ácido Fusídico Neogen creme; Fusqero Creme http://www.merckmanual.net