

Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia (EF)	
O presente protocolo permite auxiliar o farmacêutico a dispensar o medicamento após análise, evitar a dispensa inapropriada caso não sejam cumpridas as condições estabelecidas e detetar situações que devem ser referenciadas para a consulta médica	
DCI/ dosagem	Mupirocina 20 mg/g
Classificação farmacoterapêutica	13. Medicamentos usados em afeções cutâneas/ 13.1 Anti-infecciosos de aplicação na pele/ 13.1.2 Antibacterianos
Condição de Dispensa EF	Tratamento das seguintes infeções cutâneas causadas por microrganismos sensíveis em adultos e crianças com idade igual ou superior a 1 ano: - Infeções primárias tais como impetigo, foliculite e furunculose. - Infeções secundárias tais como a sobreinfeção na dermatite atópica, dermatite eczematosa, dermatite de contacto e em lesões traumáticas, desde que a área superficial seja limitada.
Via de administração	Para uso externo – uso cutâneo
Versão/data de aprovação	Versão 1 aprovado em 30/06/2025

O FARMACÊUTICO DEVERÁ VISUALIZAR A ZONA AFETADA

- 1- Questionar se tem alguma das seguintes patologias/situações: dermatite atópica, dermatite eczematosa, dermatite de contacto e em lesões traumáticas**

FATORES A TER EM CONSIDERAÇÃO:

- 1 Hipersensibilidade à substância ativa ou aos excipientes
- 2 Gravidez e amamentação
- 3 Comorbilidades
- 4 Eventual medicação utilizada para infeção da pele localizada



CONDIÇÕES DISPENSA “EF”

Tratamento das seguintes infeções cutâneas causadas por microrganismos sensíveis em adultos e crianças com igual ou superior a 1 ano:

- Infeções primárias tais como impetigo, foliculite e furunculose.
- Infeções secundárias tais como a sobreinfeção na dermatite atópica, dermatite eczematosa, dermatite de contacto e em lesões traumáticas, desde que a área superficial seja limitada



CRITÉRIOS PARA REFERENCIAÇÃO PARA A CONSULTA MÉDICA

Idade inferior a 1 ano:

- Se não tiver certeza quanto ao diagnóstico
- Infeções em grandes áreas de pele
- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer excipiente
- Indivíduos com uma das patologias ou condições



CUMPRE COM QUALQUER UM DOS CRITÉRIOS



REFERENCIAÇÃO PARA CONSULTA MÉDICA

SE CUMPRE CUMULATIVAMENTE CONDIÇÕES DISPENSA “EF” DISPENSAR O MEDICAMENTO E PRESTAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO/ RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Dosagem máxima por unidade: 20mg/g
- Posologia: 2-3 vezes por dia durante 5-10 dias.
- Dimensão máxima da embalagem: 30g
- Recomendações: Ver anexo

Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia (EF) – ANEXO: MUPIROCINA	
DCI/ dosagem	Mupirocina; 20 mg/g
Classificação farmacoterapêutica	13. Medicamentos usados em afeções cutâneas/ 13.1 Anti-infecciosos de aplicação na pele/ 13.1.2 Antibacterianos
Condição de Dispensa EF	Tratamento das seguintes infeções cutâneas causadas por microrganismos sensíveis em adultos e crianças: - Infeções primárias tais como impetigo, foliculite e furunculose. - Infeções secundárias tais como a sobreinfeção na dermatite atópica, dermatite eczematosa, dermatite de contacto e em lesões traumáticas, desde que a área superficial seja limitada
Via de administração	Para uso externo – uso cutâneo
Informação adicional à dispensa	<p>A mupirocina é um antibiótico, que atua através da inibição da síntese proteica, competindo com a isoleucina para o local de ligação na enzima isoleucil tRNA sintetase, prevenindo assim a incorporação de isoleucina na cadeia nascente de aminoácidos. Os microrganismos frequentemente suscetíveis à mupirocina são:</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus spp</i></p> <p>Poderá o próprio utente identificar a condição ao farmacêutico, por já ter diagnóstico médico prévio.</p> <p>Cabe ao farmacêutico, mediante a descrição dos sintomas por parte do utente, e visualização da zona afetada, analisar se a situação se enquadra na indicação abaixo descrita. Caso existam dúvidas, o farmacêutico deverá proceder à referência para consulta médica.</p> <p>Dispensar apenas nas indicações abaixo descritas:</p> <p>Infeções primárias tais como impetigo, foliculite</p> <p>Impetigo é uma infeção bacteriana da pele, causada por bactérias estafilococos ou estreptococos. É uma infeção frequente que afeta sobretudo crianças em idade pré-escolar. O contágio pode ocorrer através do contacto direto com feridas ou gotículas da secreção nasal das crianças infetadas ou, ainda, por objetos pessoais contaminados (roupas pessoais, de cama, de banho, brinquedos, etc). Clinicamente distinguem-se duas formas: o impetigo bolhoso, caracterizado pela presença de lesões bolhosas e o impetigo não bolhoso, mais frequente, em que estão presentes lesões crostosas da cor de mel, características da doença.</p> <p>Foliculite é uma doença de pele comum que afeta os folículos pilosos (estruturas da pele onde os pelos surgem e crescem) provocando a sua inflamação. Esta doença pode ocorrer em várias partes do corpo (incidindo com mais frequência nas zonas com maior pilosidade, como o couro cabeludo ou a barba), sendo a maioria dos casos ligeiros e com evolução favorável. Contudo, em alguns doentes pode causar complicações graves e que necessitam de tratamento adequado. A foliculite pode afetar pessoas de todas as idades. É, geralmente,</p>

causada por uma bactéria ou fungo que causa a inflamação nos folículos e manifesta-se através de pápulas inflamatórias (borbulhas vermelhas) e pústulas. Sendo que é comum a Inflamação dos folículos pilosos causada por uma infeção por *Staphylococcus*.

Se a infeção afetar uma grande área da pele, o utente deve ser reencaminhado para o médico

Infeções secundárias tais como a sobreinfeção na dermatite atópica, dermatite eczematosa, dermatite de contacto e em lesões traumáticas, desde que a área superficial seja limitada.

Nestes casos a infeção secundária é provocada por *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus spp* numa pele sensibilizada por uma das seguintes patologias/situações: dermatite atópica, dermatite eczematosa, dermatite de contacto e em lesões traumáticas

Dermatite é uma doença inflamatória crónica da pele. Os principais efeitos visíveis são a vermelhidão, edema (inchaço), prurido (comichão), pele seca, fissuras, lesões descamativas, crostas e exsudação.

Dermatite atópica (eczema) ou dermatite eczematosa: é uma inflamação crónica e pruriginosa nas camadas superficiais da pele, e que afeta indivíduos que sofrem de rinite alérgica ou de asma, bem como pessoas que têm familiares com estas doenças

Dermatite de contato: é uma inflamação da pele causada por contato direto com uma substância em particular. A erupção cutânea pode originar muito prurido, mas mantendo-se limitada a uma área específica, e geralmente com bordas bem definidas.

Se a infeção afetar uma grande área da pele, o utente deve ser encaminhado para o médico

Recomendações para o utente:

1-Modo de administração

Aplicar uma pequena quantidade de pomada sobre a área afetada.

Se necessário, a área tratada deve ser coberta oclusivamente ou com uma gaze.

A área a ser tratada deve ser cuidadosamente limpa e seca antes da aplicação

2-Se não forem observadas melhorias após 3-5 dias de tratamento com mupirocina, deve ser reconsiderado o diagnóstico e/ ou o tratamento.

3-É apenas para uso cutâneo e deve ser evitado o contacto com os olhos e mucosas. Se o medicamento entrar em contacto com os olhos, lave os olhos abundantemente com água até todos os vestígios de pomada terem sido removidos.

3-Não é adequada para uso intranasal

4-Caso ocorra uma reação de sensibilização ou irritação local grave com o uso deste medicamento, o tratamento deve ser interrompido, quaisquer vestígios de pomada devem ser limpos e iniciada terapêutica alternativa apropriada para a infeção.

	<p>5-O uso prolongado deste medicamento pode resultar na seleção de microrganismos resistentes. Deve ser respeitado a duração máxima de tratamento (10 dias)</p>
<p>Patologias ou condições em que é contraindicada ou não recomendada a aplicação deste medicamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contém polietilenoglicol (macrogol) - se o utente tiver insuficiência renal moderada ou grave a função renal poderá agravar-se, uma vez que a pomada pode ser absorvida pelo organismo se aplicada em pele lesada, especialmente no caso de áreas extensas ou feridas abertas. - Gravidez e amamentação
<p>Interações medicamentosas</p>	<p>Não é recomendado o tratamento em simultâneo com outros medicamentos tópicos sobre a mesma área da pele.</p> <p>Não foram realizados estudos de interação com outros medicamentos</p>
<p>Referências</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RCM de Mupirocina ISDIN aprovado em 30/06/2025 - Protocolo de dispensa do Ácido fusídico (20 mg/g, consultado em 04/10/2024, disponível em: https://www.infarmed.pt/documents/15786/79990/1_Ac_Fusidico_2015_02_18.pdf/f075f1ac-1f4a-482c-aab6-a6051de4eec0 - Manual MSD, versão para profissionais de saúde, Dermatite atópica (eczema) ou dermatite eczematosa, consultado em 04/10/2024, disponível em: https://www.msmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/dermatite/dermatite-at%C3%B3pica-eczema?query=Dermatite%20at%C3%B3pica%20(eczema) - Manual MSD, versão para profissionais de saúde, Dermatite de contato, consultado em 04/10/2024, disponível em https://www.msmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/dermatite/dermatite-de-contato?query=Dermatite%20de%20contato - Manual MSD, versão para profissionais de saúde, impetigo consultado em 04/10/2024, disponível em https://www.msmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-da-pele/impetigo-e-ectima?query=Impetigo - Manual MSD, versão para profissionais de saúde, foliculite consultado em 04/10/2024, disponível em https://www.msmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-da-pele/foliculite?query=foliculite