

FAZ TRATAMENTO PARA EPILEPSIA, DOENÇA BIPOLAR OU PREVENÇÃO DA ENXAQUECA

COM VALPROATO OU ÁCIDO
VALPRÓICO?



GRAVIDEZ E MEDICAMENTOS CONTENDO VALPROATO OU ÁCIDO VALPRÓICO

Mulheres em idade fértil

Deve utilizar um método de contraceção eficaz.



Se planeia engravidar

Não pare o contracetivo antes de falar com o seu médico e acordar um plano para garantir que a epilepsia, doença bipolar ou prevenção da enxaqueca está controlada. Não deixe de tomar Valproato sem que o seu médico aconselhe a fazê-lo.



Se está ou pensa estar grávida

Não interrompa o tratamento com Valproato sem falar com o seu médico, que discutirá consigo as opções terapêuticas mais adequadas ao seu caso. Consulte urgentemente o seu médico.

Homens



Se planeia conceber

Não pare a contraceção antes de falar com o seu médico. Não deixe de tomar Valproato sem que o seu médico aconselhe a fazê-lo.



Se a sua parceira engravidar enquanto toma Valproato (ou tomou até 3 meses antes da concepção)

Não interrompa o tratamento com Valproato. Tanto o utente como a parceira devem consultar o médico.

Não doe esperma durante o tratamento (e até 3 meses após parar).



EM QUALQUER DAS SITUAÇÕES CONSULTE O SEU MÉDICO **COM URGÊNCIA**

Estes medicamentos podem causar malformações graves nos bebés e afetar o seu desenvolvimento durante o crescimento.

Reveja também o “Guia da doente a tomar Valproato sobre contraceção e gravidez” bem como o “Guia do doente do sexo masculino a tomar Valproato”, disponíveis na INFOMED.



<https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo/>

Os medicamentos contendo valproato ou ácido valpróico autorizados em Portugal indicados para o tratamento da epilepsia, do transtorno bipolar e para a prevenção da enxaqueca são: Ácido valpróico Aurovitas, Ácido Valpróico Generis, Ácido valpróico Generis Phar, Ácido Valpróico Ratiopharm, Depakine, Depakine Chrono, Depakine Chronosphere, Dilexil, Dilexil-R, Epixival, Proxandra, Valproato de sódio Altan, Valproato de sódio Seacross, Valproato semisódico Tecnifar